


RESULTADO DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Período 1978 - 2014



Porcentaje de éxito en el tratamiento de casos de tuberculosis por jurisdicción.
República Argentina, 2014.



Ministerio de Salud
Presidencia de la Nación

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

PERÍODO 1978 – 2014

PRO.TB.DOC.TEC. N°30/16

Santa Fe, Agosto de 2016



Resultados del tratamiento de la tuberculosis en la República Argentina

Período 1978 –2014

Este documento fue realizado en el Departamento Programas de Salud

Responsables: Juan Carlos Bossio - Jefe del Departamento
Hugo Fernández
Sergio Arias
Gustavo Armando
Magalí Wettstein
Natalia Mordini

Edición: Magalí Wettstein
Natalia Mordini

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni”
Avda. Blas Parera 8260
Santa Fe – Argentina
TE: +54-342-4892827/4896850/4892525
Fax: +54-342-4896850/4896851
E-mail: secretaria.direccionconi@gmail.com

AUTORIDADES

Ing. Mauricio MACRI
Presidencia de la Nación

Dr. Jorge Daniel LEMUS
Ministerio de Salud de la Nación

Dr. Eduardo Francisco MUNIN
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

Dr. Carlos Alberto UBEIRA
*Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
(ANLIS) Dr. Carlos G. Malbrán*

Dra. Norma Bibiana VANASCO
*Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER) Dr. Emilio Coni*



CONTENIDO

Resultados del Tratamiento de la Tuberculosis en la República Argentina. Período 1978-2014

1.	Introducción y Resumen	1
2.	Metodología.....	1
3.	Definición de casos utilizados en el análisis	2
4.	Resultados	4
4.1.	Resultados del tratamiento para el total de casos TB.....	4
4.2.	Antecedentes de tratamiento contra TB.....	4
4.3.	Localización de los casos, confirmación bacteriológica.....	6
4.4.	Modalidad de tratamiento	7
4.5.	Distribución por Sexo	10
4.6.	Distribución por edad.....	12
4.7.	Distribución por jurisdicción.....	14
4.8.	Grupos de riesgo	19
4.9.	Análisis de la tendencia del resultado del tratamiento	22
5.	Discusión y Conclusiones	23

ANEXO: Tablas y gráficos para el país y sus jurisdicciones

1.	Argentina	36
2.	Buenos Aires	43
3.	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	46
4.	Catamarca.....	49
5.	Córdoba.....	52
6.	Corrientes.....	55
7.	Chaco	58
8.	Chubut.....	61
9.	Entre Ríos	64
10.	Formosa.....	67
11.	Jujuy.....	70
12.	La Pampa.....	73
13.	La Rioja	76
14.	Mendoza	79
15.	Misiones.....	82
16.	Neuquén	85
17.	Río Negro.....	88
18.	Salta.....	91
19.	San Juan.....	94
20.	San Luis	97
21.	Santa Cruz.....	100
22.	Santa Fe	103
23.	Santiago del Estero.....	106
24.	Tierra del Fuego.....	109
25.	Tucumán	112

Resultados del Tratamiento de la cohorte 2014 de casos de Tuberculosis en la República Argentina

Gustavo Armando¹
Magalí Wettstein¹

1. Introducción y Resumen

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa producida por el *Mycobacterium tuberculosis*, considerada actualmente una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Solo durante el año 2015 fue responsable de 1,8 millones de muertes.² La falta de detección de casos, los abandonos del tratamiento, y la aparición de resistencia a los fármacos antituberculosos, entre otras circunstancias, generan que la TB siga siendo un problema de salud pública importante en la actualidad. Sin embargo, la curación de la mayoría de los pacientes debiera ser posible mediando un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado.

El tratamiento de la TB es la base de todo programa nacional de lucha antituberculosa. Las estrategias modernas de tratamiento se basan en regímenes estandarizados de quimioterapia antituberculosa, aplicados en condiciones apropiadas de vigilancia de los casos.³ En este sentido, los objetivos del tratamiento no solo consisten en lograr la curación del paciente individual y prevenir su muerte, sino también prevenir las recaídas, reducir la transmisión de TB en la población, y prevenir el desarrollo de TB resistente a drogas.⁴

Asimismo, el análisis de los resultados del tratamiento es uno de los instrumentos de gestión más importantes para evaluar la efectividad de un programa de control de TB. Permite identificar posibles problemas y dificultades y realizar la correspondiente evaluación tendiente a reconocer sus causas o determinantes, eventualmente llevando a tomar las medidas pertinentes para solucionarlos y mejorar el propio programa.³

En este documento se presentan los resultados del tratamiento de los casos de TB registrados en Argentina durante el año 2014. La información se obtuvo a partir de los datos proporcionados por las actividades de vigilancia que realizan las 24 jurisdicciones del país en el marco del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Se continúa de este modo la serie ininterrumpida de documentos de evaluación de este valioso indicador operativo de los logros en materia de control de la enfermedad desde el año 1978.

2. Metodología

La notificación de los casos de TB se realiza a través de un módulo de TB integrado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), que permite el reporte individual de los casos por parte de los servicios de salud a lo largo de todo el país, de manera remota e inmediata.

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni" es responsable de la vigilancia de la TB en el país en el marco del Programa Nacional de TB. Es función del INER implementar

¹Profesionales del Departamento Programas de Salud. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni. Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán". Noviembre de 2016.

² World Health Organization. Global tuberculosis report 2016. Geneva: WHO; 2016

³ Programa Mundial contra la Tuberculosis. Tratamiento de la Tuberculosis: directrices para programas nacionales. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1997.

⁴ Zerbini, Elsa Virginia. Programa Nacional de Control de Tuberculosis: Normas Técnicas 2013. Santa Fe: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Dr. Emilio Coni; 2013.

el sistema a nivel nacional y monitorear el funcionamiento del mismo, informando a las jurisdicciones sobre el estado de integridad de la información de los casos notificados y las inconsistencias encontradas, con el fin de reforzar la notificación de casos de TB y mejorar la calidad de la información. También tiene la responsabilidad de analizar la información reportada al sistema, a fin de conocer la magnitud y evolución del problema de la TB en el país y sus jurisdicciones.

Para el presente documento se utilizó la información exportada en setiembre de 2016 del módulo de TB integrado al SNVS, que contiene los casos registrados y validados de 24 jurisdicciones del país para el año 2014. El número de casos informados en el documento sobre notificación de casos de TB en 2014 puede ser diferente al presente documento debido a la actualización de los casos al momento de hacer el análisis de la información de evaluación de tratamiento.

El análisis de los resultados del tratamiento se realiza mediante el cálculo de proporciones en relación a las distintas características analizadas, las cuales fueron seleccionadas de acuerdo a la bibliografía consultada sobre la TB.

Para el contraste de dos proporciones se emplea la prueba Z, con un nivel de significancia de 0,05. Para analizar la asociación entre variables se utiliza la prueba Ji-Cuadrado con nivel de significancia de 0,05. La existencia de asociación y la magnitud de la misma se analizan mediante el cálculo del riesgo relativo (RR) y sus intervalos de confianza al 95%.

Para la evaluación del efecto de los factores simultáneamente y obtener la fuerza de asociación de forma ajustada (odds ratio ajustado) se realiza un análisis multivariado con la aplicación de un modelo de regresión logística binaria.

El procesamiento se realizó en planillas de cálculo Excel y para el análisis estadístico se utilizó el programa R 3.3.1.

3. Definición de casos utilizados en el análisis⁵

Resultados del tratamiento

- **Tratamiento completo:** Paciente con TB que completó el tratamiento sin evidencia de fracaso, PERO sin constancia que muestre que la baciloscopía o el cultivo de esputo del último mes de tratamiento y al menos en una ocasión anterior fueron negativos, ya sea porque las pruebas no se hicieron, o porque los resultados no estén disponibles.
- **Fracaso al tratamiento:** Paciente con TB cuya baciloscopía o cultivo de esputo es positivo en el mes 5 o posterior durante el tratamiento.
- **Fallecido:** Paciente con TB que muere por cualquier razón antes de comenzar o durante el curso del tratamiento.
- **Pérdida en el seguimiento:** Paciente con TB que no inició tratamiento o interrumpió el tratamiento durante 2 meses consecutivos o más.
- **No evaluado:** Paciente con TB al que no se le ha asignado el resultado de tratamiento. Incluye los casos «transferidos» (traslado) a otra unidad de tratamiento y también los casos cuyo resultado del tratamiento se desconoce en la unidad que reporta.
- **Tratamiento Exitoso:** La suma de curados y tratamientos completos.

Por razones de conveniencia y familiarización, para este documento, los casos clasificados como pérdida de seguimiento serán identificados con su definición anterior de abandono.

El resultado de tratamiento fue evaluado según las siguientes covariables:

⁵ Definiciones y marco de trabajo para la notificación de tuberculosis - revisión 2013. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2013. http://www.who.int/iris/bitstream/10665/111016/1/9789243505343_spa.pdf.

Ingreso al tratamiento

- **Pacientes nuevos** que nunca han sido tratados por TB o que han recibido medicamentos anti TB por menos de un mes.
- **Pacientes previamente tratados** que han recibido un mes o más de los medicamentos anti-TB en el pasado:
 - **Pacientes con recaída:** (recaída) han sido previamente tratados por TB, fueron declarados curados o con el tratamiento completo al final de su último ciclo de tratamiento, y son diagnosticados con un episodio recurrente de TB.
 - **Pacientes con tratamiento después de fracaso:** (fracaso) son aquellos previamente tratados por TB y en los que su tratamiento fracasó al final de su más reciente curso de tratamiento.
 - **Pacientes con tratamiento después de pérdida al seguimiento:** (reingreso de abandono) fueron tratados previamente por TB y declarados, al final de su tratamiento más reciente, como pérdida en el seguimiento.
 - **Otros pacientes previamente tratados:** (otros antecedentes) son aquellos que han sido previamente tratados por TB, pero cuyo resultado después del tratamiento más reciente es desconocido o indocumentado. Se incluyen los casos clasificados como traslado en la notificación de casos
- **Pacientes con historia desconocida de tratamientos previos por TB (sin información)** que en el presente documento fueron considerados como casos nuevos
- Los casos nuevos, recaídas de TB y pacientes con historia desconocida de tratamiento de TB son considerados casos nuevos y recaídas de TB.
- **Retratamientos:** para este documento se denominan así a los casos **previamente tratados sin considerar las recaídas.**

Localización anatómica

- **Tuberculosis pulmonar:** se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de TB, que implica un parénquima pulmonar o el árbol traqueo bronquial.
- **Tuberculosis extrapulmonar:** se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de TB que involucra otros órganos que no sean los pulmones, por ejemplo, pleura, ganglios linfáticos, abdomen, tracto genitourinario, piel, articulaciones, huesos y meninges.

Resultado de baciloscopia

- **Paciente con baciloscopia positiva (BK+)** es quien tenga una muestra biológica positiva por baciloscopia

Resistencia a medicamentos

- **Paciente con multidrogorresistencia (MDR):** resistencia al menos a la isoniacida (H) y la rifampicina (R).

Estado de HIV

- **Paciente con TB y sin HIV:** se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de TB y que tiene un resultado negativo de la prueba del HIV realizada al momento del diagnóstico de la TB.

4. Resultados

4.1. Resultados del tratamiento para el total de casos TB

En el año 2014 se notificaron 10.641 casos de TB de todas las formas, 6,5% (653 casos) más que en 2013. Entre ellos, 3.267 casos (30,7%) no contaron con la evaluación del tratamiento, de los cuales 381 fueron registrados como traslados (3,6%) y 2.886 no registraron información sobre el resultado del tratamiento (27,1%) (tabla 1).

De los 7.374 casos con información sobre el resultado del tratamiento, 5.653 (76,7%) tuvieron un tratamiento exitoso, lo que representa el 53,1% del total de los casos notificados en 2014.

El porcentaje de éxito y abandono fue mayor en 2014 en relación a 2013, este aumento fue 4,3% (569 casos más) y 22,6% (212 casos más) respectivamente

Tabla 1. Distribución de casos de TB todas las formas notificados según la evaluación de tratamiento. Argentina 2014

Resultados del tratamiento	Número	% ¹	% ²
Total	10641		100,0
Evaluados	7374	100,0	69,3
Éxito	5653	76,7	53,1
Abandono	1148	15,6	10,8
Fallecido	561	7,6	5,3
Fracaso	12	0,2	0,1
No evaluados	3267	100,0	30,7
Traslado	381	11,7	3,6
Sin Información	2886	88,3	27,1

¹ Porcentaje sobre el total de casos evaluados y no evaluados

² Porcentaje sobre el total de casos notificados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del País. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2016.

4.2. Antecedentes de tratamiento

En 2014, de los 10.641 casos notificados, 9.709 (91,2%) fueron considerados como casos nuevos y recaídas, siendo 8992 (84,5%) casos nuevos, 530 (4,9%) recaídas y 187 (1,8%) casos sin información. Por otro lado, fueron 932 (8,8%) los casos registrados como no nuevos, correspondiendo a 448 (4,2%) a reingresos de abandono, 304 (3,0%) a otros antecedentes y 24 (0,2%) a fracasos (Tabla 2).


Tabla 2. Distribución de casos de TB todas las formas notificados según clasificación al inicio de tratamiento. Argentina 2014.

Tipo de paciente	Número	%
Total	10641	100,0
Nuevo	8992	84,5
Recaída	530	5,0
Sin Información	187	1,8
Reingreso de abandono	448	4,2
Traslado	132	1,2
Otros antecedentes	328	3,1
Fracaso	24	0,2

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del País. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2016.

La evaluación del tratamiento mostró diferencias entre los casos nuevos-recaídas y los casos no nuevos. El éxito de tratamiento fue 20% mayor en los casos nuevos-recaídas que en los no nuevos, mientras que el abandono fue 53,6% mayor en los casos no nuevos. Por otro lado, el porcentaje de mortalidad y la falta de información sobre el resultado del tratamiento fueron similar en ambos grupos (Figura 1).

Para el total de casos evaluados, los pacientes no nuevos presentaron resultados de tratamiento menos favorables que los casos nuevos y recaídas. Esto se ve reflejado en el hecho de que el riesgo de un resultado **no exitoso** entre los casos retratados (excluyendo recaídas) fue un 98% mayor que en los casos nuevos o recaídas (RR: 1,98; 1,70- 2,30).



La información de los pacientes con Fracaso un fue analizada ya que esa categoría cuenta con el 70% de casos sin información sobre el tratamiento, en los demás grupos el porcentaje de sin información ronda el 30% (tabla 3).

Tabla 3: Resultado de tratamiento los casos de TB todas las formas según antecedentes de tratamiento. Argentina, 2014.

Resultados del tratamiento	TOTAL	Casos nuevos/ Recaídas				Casos no nuevos							
		Nuevos		Recaídas		Reingreso de abandono		Fracasos		Otros		Traslados	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	N	%
Total	10641	9179	100,0	530	100,0	448	100,0	24	100,0	328	100,0	132	100,0
Evaluados¹	7374	6373	69,4	363	68,5	295	65,8	7	29,2	248	75,6	88	66,7
Éxito²	5653	4998	78,4	256	70,5	143	48,5	5	71,4	182	73,4	69	78,4
Abandono²	1148	882	13,8	73	20,1	125	42,4	1	14,3	49	19,8	18	20,5
Fallecido²	561	485	7,6	32	8,8	25	8,5	1	14,3	17	6,9	1	1,1
Fracaso²	12	8	0,1	2	0,6	2	0,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No evaluados¹	3267	2806	30,6	167	31,5	153	34,2	17	70,8	80	24,4	44	33,3
Traslado³	381	318	11,3	15	9,0	16	10,5	1	5,9	15	18,8	16	36,4
Sin Información³	2886	2488	88,7	152	91,0	137	89,5	16	94,1	65	81,3	28	63,6

¹Porcentaje sobre el total de casos.

² Porcentaje sobre el total de casos con evaluación del tratamiento

³ Porcentaje sobre el total de casos sin evaluación del tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2016

Para los casos con evaluación, el análisis de los resultados del tratamiento para el total de los casos de TB según sus antecedentes de tratamiento refleja que los mayores porcentajes de éxito se encontraron en los casos nuevos y en los traslados, presentando cada una de estas categorías un 78,4% de éxito en el tratamiento de sus casos. Por otro lado, el menor porcentaje de éxito se encontró en los reingresos de abandono (48,5%). Las categorías restantes analizadas presentaron un porcentaje de éxito de 70,5% para las recaídas y 73,4% para los casos clasificados como otros.

El abandono fue menor en los casos nuevos 13,7% y alcanzó al 42,4% en los pacientes que eran reingreso de abandono, el porcentaje de fallecidos fue más bajo en traslado y similar en el resto de los grupos.

4.3. Localización de los casos, confirmación bacteriológica

De los casos nuevos-recaídas según localización y confirmación por baciloscopia, se encontró que 8299 casos correspondieron a TB pulmonar (85,5%), y entre éstos 5446 (65,9%) tuvo confirmación por baciloscopia. Los casos de TB extrapulmonares representaron el 13,5% del total de casos de TB notificados y se desconoce la localización del 0,9% restante.

El porcentaje de información sobre evaluación de tratamiento fue mayor para los casos pulmonares que para los extrapulmonares, 70,2% y 64,8% respectivamente. Lo mismo ocurrió cuando se analizó por el resultado de la baciloscopia, los casos evaluados con baciloscopia positiva fue 4,8% mayor que los resultado con baciloscopia negativa o no realizada. (Tabla 4)

El éxito de tratamiento fue del 78,5% para los casos con localización pulmonar, siendo similar entre aquellos con o sin confirmación por examen directo (BK (+) y BK (-)/NR). Los casos de localización extrapulmonar tuvieron un menor porcentaje de éxito (70,0%) al compararlo con los casos de TB Pulmonar aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa ($p=0,054$).

Tabla 4. Resultado de tratamiento para el total de casos de TB nuevos y recaídas notificados según localización y confirmación por baciloscopia. Argentina, 2014.

Resultado del tratamiento	TOTAL	Pulmonares BK(+)		Pulmonares BK(-)/NR		Extrapulmonares		Sin información	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Total	9709	5446	100	2853	100,0	1317	100,0	93	100,0
Evaluados¹	6736	3914	71,9	1915	67,1	854	64,8	53	57,0
Éxito²	5254	3078	78,6	1496	78,1	646	75,6	34	64,2
Abandono²	955	549	14,0	281	14,7	113	13,2	12	22,6
Fallecido²	517	280	7,2	135	7,0	95	11,1	7	13,2
Fracaso²	10	7	0,2	3	0,2	0	0,0	0	0,0
No evaluados¹	2973	1532	28,1	938	32,9	463	35,2	40	43,0
Traslado³	333	191	12,5	95	10,1	45	9,7	2	5,0
SinInformación³	2640	1341	87,5	843	89,9	418	90,3	38	95,0

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con evaluación de tratamiento

³ Porcentaje sobre el total de casos sin evaluación de tratamiento

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del País. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2016

El abandono del tratamiento fue similar entre los casos pulmonares y extrapulmonares, lo mismo se observó al comparar los casos pulmonares confirmados o no por examen directo. El riesgo de abandonar el tratamiento fue similar cuando se compararon los pacientes con TB extrapulmonares con pulmonares RR: 1,04(0,86-1,27), lo mismo ocurrió cuando se comparó los BK(+) de los B(-)/NR RR: 0,95 (0,82-1,10).

En los casos en que no fue posible identificar la localización de la TB, el porcentaje de pacientes no evaluado fue aproximadamente un 25% mayor que en el resto de las categorías, si consideramos los casos evaluados, podemos ver también que el porcentaje de abandono (22,6%) fue mayor en este grupo que en los restantes.

Finalmente, la proporción de casos que fallecieron fue 35,9% mayor en el grupo de casos de TB extrapulmonares, que en los pulmonares ($p < 0.01$), esto podría ser consecuencia de las formas extrapulmonares graves como TB meníngea y diseminada. No se encontró diferencias estadísticamente significativa cuando se comparó BK (+) y Pulmonares BK (-)/NR ($p = 0.92$).

4.4. Modalidad de tratamiento

La distribución de casos de TB según la modalidad de tratamiento fue similar cuando se analizaron tanto los casos nuevos-recaída como los no nuevos. En ambos grupos en promedio el 51,7% recibió un tratamiento bajo la modalidad autoadministrada, aproximadamente un 40,9% tratamiento supervisado y un 4,2% con modalidad mixta. El 3,2% no contaban con la información de la modalidad del tratamiento (Tabla 5).

Tabla 5: Casos de TB de todas las formas según modalidad de tratamiento. Argentina, 2014.

Modalidad de tratamiento	Casos nuevos/Recaídas		Casos no nuevos	
	n	%	n	%
Total	9709	100,0	932	100,0
Supervisado	4158	42,8	363	38,9
Mixto	368	3,8	43	4,6
Autoadministrado	4918	50,7	492	52,8
Sin Información	265	2,7	34	3,6

¹ Porcentaje sobre el total de casos.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2016.

Al analizar el resultado de tratamiento en los casos nuevos-recaídas según la modalidad del mismo, se observó que la modalidad supervisado presentó el menor porcentaje de casos sin evaluación de tratamiento 18,2% cuando se comparó con el resto ($p < 0,01$). Por otro lado, la modalidad Mixto presentó un 58,7% de casos no evaluados, mientras que la modalidad autoadministrado 36,6%. (Figura 2 y Tabla 6)

Los casos nuevos-recaídas que realizaron un tratamiento autoadministrado fueron quienes presentaron el menor porcentaje de éxito (75,6%) al ser comparados con los casos con tratamiento supervisado o mixto; 80,6% y 77,6% respectivamente. Esta diferencia fue estadísticamente significativa con pacientes con tratamiento supervisado ($p < 0,01$), pero no con aquellos que recibieron tratamiento mixto ($p = 0,63$).

En esta categoría la mayor proporción de abandono se presentó en el grupo con tratamiento autoadministrado (19,4%), siendo 4 puntos mayor que entre quienes recibieron tratamiento mixto (15,8%) y más del doble que los pacientes con tratamiento supervisado (9,2%). La diferencia en el abandono de tratamiento fue estadísticamente significativa entre el porcentaje de los casos con tratamiento supervisado y el resto de las categorías ($p < 0,001$), pero no se encontró diferencias estadísticas entre Mixto y Autoadministrado ($p = 0,29$).

La mortalidad se distribuyó de manera diferente en los grupos, el mayor porcentaje lo tuvo el tratamiento supervisado, 10,1%.



Los casos clasificados como no nuevos presentaron una proporción de evaluación de tratamiento que va desde 55,8% en los casos con tratamientos mixtos a 73,0% en los que tuvieron tratamiento supervisado. (Tabla 6)

En los casos no nuevos el abandono se distribuyó de manera diferente según el tipo de tratamiento, el 36% lo tuvieron los casos con tratamiento autoadministrado, el 29,2% fueron el tratamiento mixto y el 23,4% el supervisado.

Tabla 6: Resultado de tratamiento para los casos de TB todas las formas según modalidad y antecedentes de tratamiento. Argentina, 2014.

Modalidad de tratamiento	TOTAL	Supervisado				Autoadministrado				Mixto				Sin información			
		Nuevos/Recaídas		No nuevo		Nuevos/Recaídas		No nuevo		Nuevos/Recaídas		No nuevo		Nuevos/Recaídas		No nuevo	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Total	10641	4158	100,0	363	100,0	4918	100,0	492	100,0	368	100,0	43	100,0	265	100,0	34	100,0
Evaluados¹	7374	3402	81,8	265	73,0	3120	63,4	339	68,9	152	41,3	24	55,8	62	23,4	10	29,4
Éxito²	5653	2742	80,6	185	69,8	2358	75,6	195	57,5	118	77,6	15	62,5	36	58,1	4	40,0
Abandono²	1148	314	9,2	62	23,4	606	19,4	122	36,0	24	15,8	7	29,2	11	17,7	2	20,0
Fallecido²	561	345	10,1	18	6,8	147	4,7	20	5,9	10	6,6	2	8,3	15	24,2	4	40,0
Fracaso²	12	1	0,0	0	0,0	9	0,3	2	0,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No evaluados¹	3267	756	18,2	98	27,0	1798	36,6	153	31,1	216	58,7	19	44,2	203	76,6	24	70,6
Traslado³	381	105	13,9	18	18,4	206	11,5	28	18,3	19	8,8	1	5,3	3	1,5	1	4,2
Sin Información³	2886	651	86,1	80	81,6	1592	88,5	125	81,7	197	91,2	18	94,7	200	98,5	23	95,8

¹ Porcentaje sobre el total de casos.

² Porcentaje sobre el total de casos con evaluación del tratamiento

³ Porcentaje sobre el total de casos sin evaluación del tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2016.


El éxito de tratamiento en los casos no nuevos fue mayor en el grupo con tratamiento supervisado (69,8%), encontrándose diferencias estadísticamente significativas con los casos con tratamiento autoadministrado ($p=0,0025$), pero no con los casos tratados en forma mixta ($p=0,6086$). No se encontró diferencias estadísticas entre el éxito entre autoadministrados y mixto en esta categoría de pacientes ($p=0,7923$). El porcentaje de fallecidos fue mayor en las formas de tratamiento mixtas, sin embargo las diferencia no fue estadísticamente significativa con el resto de las categorías de modalidad de tratamiento ($p=0,8925$ y $p=0,9679$ para los casos supervisados y autoadministrado respectivamente).

Sobre el total de casos con evaluación de tratamiento y con información sobre la modalidad del mismo, la proporción de éxito fue mayor en los casos nuevos-recaídas que en aquellos pacientes clasificados como retratamiento, esto se observó en todas las modalidades, las diferencias fueron significativas en las modalidades supervisado y autoadministrado ($p<0,001$), pero no alcanzaron significancia estadística en la modalidad mixta ($p=0,1700$).

El abandono de tratamiento fue menor en los casos nuevos-recaídas que en los casos no nuevos para todas las modalidades de tratamiento pero esta diferencia fue solo estadísticamente significativa para el caso de tratamiento supervisado y autoadministrado ($p<0,0001$), pero no para el tratamiento mixto ($p=0,1900$).


La proporción de fallecidos se comportó de forma diferente según la modalidad de tratamiento y antecedente de tratamiento. Para el tratamiento supervisado el porcentaje de mortalidad fue mayor para los casos nuevos-recaídas en relación a los casos no nuevos. En los demás tipos de tratamientos el porcentaje fue mayor en los no nuevos. No se encontró evidencias estadísticas ($p>0,05$) cuando se compararon todos los grupos entre sí.

Al agrupar las modalidades de tratamiento mixto y supervisado, fundado en los escasos casos de TB que recibieron un tratamiento mixto y que además se comparten gran parte de las características con un tratamiento supervisado (Figura 3), la evaluación del tratamiento presenta resultados similares a los mencionados anteriormente. Consecuentemente, el éxito en el tratamiento es mayor en los casos nuevos-recaídas y bajo la modalidad supervisada/mixta, y la proporción más baja se presentó en el opuesto, esto es, en el grupo de casos no nuevos y bajo la modalidad autoadministrada. Los casos no nuevos presentaron el mayor abandono en cualquiera de las modalidades de tratamiento. Como se mencionó anteriormente los casos nuevo-recaídas con tratamiento supervisado presentaron la mayor tasa de mortalidad.



4.5. Distribución por Sexo

En la figura 4 y tabla 7 se presenta la distribución del resultado del tratamiento de los casos de TB discriminados por sexo y antecedente de tratamiento. Del total de casos el 91,0 % representaron casos nuevos-recaída, en donde el 42,2% (n=4096) eran de sexo femenino y el 57,8% (n=5589) de sexo masculino. El 0,23% (24) no contó con la información del sexo de los casos de TB notificados.



Los casos nuevos-recaídas que no cuentan con evaluación del tratamiento representan el 31,2% en los hombres y el 29,5% en las mujeres, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa ($p=0,07$).

Las mujeres presentaron mejores indicadores de tratamiento: mayor proporción de éxito y menor porcentaje de abandono y mortalidad que los hombres, siendo todas estas diferencias según sexo estadísticamente significativas ($p<0,001$). No se presentó el resultado de tratamiento "fracaso" puesto que este representó el 0,1% del total de casos con evaluación para ambos sexos.

En cuanto a los antecedentes de tratamiento según sexo, los casos no nuevos representaron el 8,8%(932), de los cuales 36,6% (342) fueron mujeres y el 63,3% varones (590).Las mujeres presentaron mayor porcentaje de éxito ($p= 0,046$) y menor porcentaje de abandono ($p= 0,02$). La mortalidad fue similar en ambos grupos ($p=0,77$), 7% aproximadamente.

Tabla 7: Resultado de tratamiento para los casos de TB todas las formas según sexo y antecedentes de tratamiento. Argentina, 2014

Modalidad de tratamiento	TOTAL	Femenino				Masculino				Sin información	
		Nuevos/Recaídas		No nuevos		Nuevos/Recaídas		No nuevos		Nuevos/Recaídas	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Total	10641	4096	100,0	342	100	5589	100,0	590	100,0	24	100,0
Evaluados¹	7374	2889	70,5	241	70,5	3846	68,8	397	67,3	1	4,2
Éxito²	5653	2384	82,5	163	67,6	2869	74,6	236	59,4	1	100,0
Abandono²	1148	342	11,8	60	24,9	613	15,9	133	33,5	0	0,0
Fallecido²	561	162	5,6	18	7,5	355	9,2	26	6,5	0	0,0
Fracaso²	12	1	0,0	0	0,0	9	0,2	2	0,5	0	0,0
No evaluados¹	3267	1207	29,5	101	29,5	1743	31,2	193	32,7	23	95,8
Traslado³	381	145	3,5	16	4,7	186	3,3	32	5,4	2	8,3
Sin Información³	2886	1062	25,9	85	24,9	1557	27,9	161	27,3	21	87,5

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

³ Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2016.

Los casos de sexo femenino tratados bajo la modalidad supervisada fueron quienes presentaron la mayor porcentaje de éxito, siendo ésta proporción significativamente mayor que los hombres bajo la misma modalidad de tratamiento ($p<0,001$) (tabla 8). El riesgo de un caso de sexo masculino de abandonar el tratamiento o de mortalidad fue significativamente mayor que un caso del sexo femenino, independiente de la modalidad de tratamiento (RR: 1,34; IC: 1,17-1,53 para abandono y RR: 1,65; IC: 1,36-2,00 para mortalidad).

La mortalidad en los casos nuevos-recaídas fue mayor en hombres que en mujeres tanto para el tratamiento supervisado/mixto, (12,3% y 7,7% respectivamente), como para la modalidad autoadministrada (5,9% y 3,0% respectivamente).

Tabla 8: Resultado de tratamiento para los casos de TB nuevos y recaídas según sexo y modalidad de tratamiento. Argentina, 2014

Modalidad de tratamiento	TOTAL	Femenino						Masculino						Sin información	
		Supervisado/Mixto		Autoadministrado		Sin información		Supervisado/Mixto		Autoadministrado		Sin información		Sin información	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Total	9709	1938	100,0	2052	100,0	106	100,0	2535	100,0	2849	100,0	154	100,0	6	100,0
Evaluados¹	6736	1568	80,9	1301	63,4	20	18,9	1935	76,3	1818	63,8	42	27,3	0	0,0
Éxito²	5254	1323	84,4	1046	80,4	15	75,0	1492	77,1	1311	72,1	21	50,0	0	-
Abandono²	955	123	7,8	216	16,6	3	15,0	205	10,6	390	21,5	8	19,0	0	-
Fallecido²	517	121	7,7	39	3,0	2	10,0	238	12,3	108	5,9	13	31,0	0	-
Fracaso²	10	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,5	0	0,0	0	-
No evaluados¹	2973	370	19,1	751	36,6	86	81,1	600	23,7	1031	36,2	112	72,7	6	100,0

Modalidad de tratamiento	TOTAL	Femenino						Masculino						Sin información	
		Supervisado/Mixto		Autoadministrado		Sin información		Supervisado/Mixto		Autoadministrado		Sin información		Sin información	
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Traslado ³	333	57	15,4	88	11,7	0	0,0	57	9,5	117	11,3	2	1,8	1	16,7
Sin Información ³	2640	313	84,6	663	88,3	86	100,0	543	90,5	914	88,7	110	98,2	5	83,3

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

³ Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015.

4.6. Distribución por edad


La mayor notificación de casos de TB se presentó en el grupo de edad de 20 a 64 años, representando el 73,6% del total. El grupo de TB pediátrica y adolescente (menores de 20 años) proporcionaron el 18,9% de los casos notificados y los mayores de 64 años, el 9,3%. No se cuenta con información de la edad en el 0,5% de los casos notificados (datos no mostrados).

En la figura 5 se presenta la distribución de la evaluación de tratamiento por grupos de edad, excluyendo los casos con fracaso de tratamiento ya que estos representaban, como máximo, el 0,2% por grupo de edad. El mayor porcentaje de información sobre evaluación de tratamiento se presenta en el grupo de 65 años y más, con un 79,6%. Este porcentaje es significativamente mayor que el reportado por los grupos de edad menores de 20 años y de 20 a 64 años ($p < 0,001$ en ambos casos), pero no se encontró diferencia estadística en la proporción de casos con evaluación de tratamiento entre pacientes menores a 20 años y de 20 a 64 años ($p = 0,92$).

El grupo de 0 a 19 años fue quien presentó los mejores resultados de tratamiento (84,4% de éxito). En relación a los casos de 20 a 64 años, las diferencias se explican por la mayor mortalidad que presenta éste último grupo de edad, ya que fue más de 6 puntos superior en el grupo de 20 a 64 años y estadísticamente significativa ($p < 0,001$).

En comparación con el resto de los grupos de edad, el grupo de 65 años y más fue quien presentó el menor porcentaje de éxito y de abandono, lo que se explica por el mayor porcentaje de mortalidad que supera el 20%, siendo éste significativamente mayor al resto de los grupos ($p < 0,001$).

Figura 5: Evaluación de tratamiento para los casos de TB todas las formas según sexo. Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2016.

En la tabla 9 se presenta la distribución del resultado de tratamiento por grupo de edad y antecedente de tratamiento. En los grupos de edades de 0 a 19 años y de 65 años y más, el mayor porcentaje de casos sin evaluación corresponde a los casos con antecedentes previos de tratamiento, siendo la diferencia entre ellos de 8 puntos. En el grupo 20 a 64 años el porcentaje de casos sin evaluación es similar entre los nuevos/recaídas (31,5%) y los no nuevos (31,2%).

El 84,5,0% de los casos nuevos-recaídas menores de 20 años fueron tratados con éxito, porcentaje significativamente mayor a los casos incidentes de 20 a 64 años y de 65 años más, quienes presentaron porcentajes de éxito de 77,7% y 69,0%, respectivamente ($p < 0,001$).

Tabla 9: Resultado de tratamiento para los casos de TB todas las formas por edad y antecedente de tratamiento. Argentina, 2014

Modalidad de tratamiento	TOTAL Número	0- 19 años				20-64 años				65 y más				Sin información	
		Nuevos/Recaídas.		No Nuevos.		Nuevos/Recaídas.		No Nuevos.		Nuevos/Recaídas.		No Nuevos.		n	%
		n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
Total	10641	1839	100,0	121	100,0	6910	100,0	737	100,0	915	100	69	100,0	50	100,0
Evaluados ¹	7374	1255	68,2	78	64,5	4736	68,5	507	68,8	728	79,6	50	72,464	20	40,0
Éxito ²	5653	1059	84,4	55	70,5	3681	77,7	304	60,0	502	69,0	38	76,0	14	70,0
Abandono ²	1148	181	14,4	20	25,6	698	14,7	168	33,1	74	10,2	4	8,0	3	15,0
Fallecido ²	561	14	1,1	3	3,8	348	7,3	33	6,5	152	20,9	8	16,0	3	15,0
Fracaso ²	12	1	0,1	0	0,0	9	0,2	2	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No evaluados ¹	3267	584	31,8	43	35,5	2174	31,5	230	31,2	187	20,4	19	27,5	30	60,0
Traslado ³	381	72	12,3	10	23,3	242	11,1	35	15,2	17	9,1	2	10,5	3	10,0
Sin Información ³	2886	512	87,7	33	76,7	1932	88,9	195	84,8	170	90,9	17	89,5	27	90,0

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

³ Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2016.

El abandono alcanza el 33,1% en casos de 20 a 64 años con antecedentes de retratamiento, valor que es más del doble de lo reportado para los casos nuevos-recaídas del mismo grupo de edad (14,7%); $p < 0,01$. Al igual que este grupo de edad en los menores de 20 años el abandono fue aproximadamente el doble en casos con tratamiento previos ($p = 0,02$). A diferencia de los grupos más jóvenes de edad, en los mayores de 64 años el porcentaje de abandono fue mayor entre los casos nuevos-recaídas (10,2%), que en los que tienen antecedentes de retratamiento (8,0%), aunque la diferencia no fue significativa ($p = 2,85$).

La mortalidad más baja se presentó en el grupo de menores de 20 años, sin diferencias según antecedente de tratamiento ($p = 0,147$), al igual que en el grupo de 20 a 64 años ($p = 0,562$). Finalmente, el grupo de mayores de 64 años, que aportó mayormente a la mortalidad por TB, los casos nuevos-recaídas fue 5 puntos superior a los casos retratados sin ser una diferencia significativa ($p = 0,57$).

El resultado del tratamiento de los casos nuevos-recaídas según edad y modalidad se presenta en la tabla 10. El 44,1% y 45,3% de los menores de 20 años y de 20 a 64 años recibieron tratamiento supervisado o mixto, modalidad que estuvo presente en el 62,1% de los casos mayores de 65 años. En todos los grupos de edad, la modalidad que presentó mayor evaluación de tratamiento es la supervisada o mixta, alcanzando a 85,0% en los mayores de 65 años.

El grupo que alcanzó el mayor éxito en el tratamiento fue el de los menores de 20 años bajo la modalidad supervisada o mixta, con un éxito del 88,1%, mayor a la modalidad autoadministrada, del 80,8% ($p = 0,001$). Este comportamiento también se evidenció en el grupo de 20 a 64 años, donde el éxito presentó una marcada diferencia entre los casos supervisados/mixtos y autoadministrados, siendo del 80,3% y 75,3%, respectivamente, $p < 0,05$. Finalmente el grupo de 65 años y más presentó menor porcentaje de éxito que los otros grupos de edad, sin evidenciarse diferencias según la modalidad de tratamiento ($p = 0,413$).

El abandono de tratamiento fue diferente según la modalidad, pero en todas las edades se observa mayor pérdida en los tratamientos autoadministrados. Quienes se trataron en forma autoadministrada tuvieron 87% más de riesgo de abandonar el tratamiento que quienes lo recibieron bajo la modalidad supervisada o mixta (RR: 1,87; IC: 1,65-2,11). Si bien esta asociación estuvo presente en todos los grupos de edad, la mayor magnitud se observa en el grupo de 20 a 64 años (RR: 1,97 IC: 1,71-2,28), mientras que el grupo de 65 años y más presentó el mayor riesgo de abandono de los tres grupos de edad (RR: 2,75; IC: 1,76-4,30).

Tabla 10: Resultado de tratamiento para los casos nuevos-recaídas de TB por edad y modalidad de tratamiento. Argentina, 2014

Modalidad de tratamiento	TOTAL	0- 19 años				20-64 años				65 y más				Sin información	
		Supervisado/Mixto		Autoadministrado		Supervisado/Mixto		Autoadministrado		Supervisado/Mixto		Autoadministrado			
	Número	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Total	9709	810	44,1	991	55,9	3133	45,3	3578	54,7	568	62,1	330	37,9	299	-
Evaluados¹	6736	638	78,8	609	61,5	2423	77,3	2267	63,4	483	85,0	238	72,1	78	26,1
Éxito²	5254	562	88,1	492	80,8	1946	80,3	1707	75,3	344	71,2	156	65,5	47	60,3
Abandono²	955	67	10,5	112	18,4	242	10,0	448	19,8	29	6,0	44	18,5	13	16,7
Fallecido²	517	9	1,4	4	0,7	234	9,7	104	4,6	110	22,8	38	16,0	18	23,1
Fracaso²	10	0	0,0	1	0,2	1	0,0	8	0,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
No evaluados¹	2973	172	27,0	382	38,5	710	22,7	1311	36,6	85	15,0	92	27,9	221	73,9
Traslado³	333	30	17,4	42	11,0	86	12,1	154	11,7	8	9,4	9	9,8	4	1,8
Sin Información³	2640	142	82,6	340	89,0	624	87,9	1157	88,3	77	90,6	83	90,2	217	98,2

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

³ Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2016.


La mortalidad presentó diferentes magnitudes por grupos de edad, siendo la diferencia más marcada entre el grupo de 65 años y más con el resto de los grupos. El análisis de cada grupo de edad según modalidad de tratamiento muestra que quienes recibieron tratamiento autoadministrado presentaron menor mortalidad que aquellos bajo modalidad supervisada.

4.7. Distribución por jurisdicción

La evaluación del resultado de tratamiento por jurisdicciones presenta dos posibles análisis, sea por jurisdicción de residencia del caso o jurisdicción de notificación. La diferencia entre jurisdicción de notificación y residencia se presentó en 2498 casos (25,7%) del total de casos notificados. Ninguna jurisdicción evaluó la totalidad de los casos notificados en el año 2014, sea el análisis a partir de la residencia del caso o de la notificación del mismo.

Tal como se observa en la figura 6, el rango de evaluación de tratamiento según jurisdicción de notificación varió desde el 28,5% en Ciudad de Buenos Aires al 98,5% en Formosa. El cuartil inferior de casos con evaluación estuvo formado por las jurisdicciones Ciudad de Buenos Aires (CABA) (28,5%), La Rioja (30,0%), con porcentajes de evaluación menores al 30%, seguido por Tierra del Fuego (63,2%), Río Negro (63,4%), Neuquén (72,7%) y Buenos Aires (74,5%). El cuartil superior incluyó las provincias de Mendoza, Misiones, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Formosa, donde el promedio de evaluación fue de 97,4%.


Figura 6: Porcentaje de casos con evaluación de tratamiento para el total de los casos según jurisdicción de notificación. Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2016.

Estos resultados no difieren a la evaluación de tratamiento según jurisdicción de residencia del caso (figura 7), con un rango de información sobre resultado de tratamiento que varió entre 21,4% en Ciudad de Buenos Aires hasta el 98,7% en la provincia de Misiones. El cuartil inferior de evaluación de tratamiento según jurisdicción de residencia estuvo integrado por las mismas jurisdicciones que integran el cuartil inferior de evaluación de tratamiento según jurisdicción de notificación (CABA (21,4%), La Rioja (33,3%), Tierra del Fuego (57,1%), Río Negro (62,2%) y Buenos Aires (64,4%)). El cuartil superior, integrado por Jujuy (95,1%), Chubut (96,1%), Mendoza (97,1%), La Pampa (97,3%), Formosa (98,1%), Misiones (98,7%) y presentó una situación más homogénea en cuanto a evaluación de tratamiento, con un promedio de 97,1% de los casos evaluados.

Figura 7: Porcentaje de casos con evaluación de tratamiento para el total de los casos según jurisdicción de residencia. Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2016.

La Provincia de Buenos Aires, que aportó el 48,03% de los casos de TB notificados para el total del país, contó con la evaluación de poco más del 60% de los casos (64,4%). CABA, que representa la segunda jurisdicción que más casos aporta al total del país (11,05% de los casos), solo registró información del 21,4% de los casos de TB residentes.

El análisis de la información de resultado de tratamiento por jurisdicción y antecedente de tratamiento se presenta en la tabla 11. Ciudad de Buenos Aires continúa siendo la jurisdicción con el menor porcentaje de casos evaluados. No se observan marcadas diferencias en la evaluación de tratamiento según antecedentes, exceptuando en algunas jurisdicciones donde los escasos casos no nuevos generan grandes variaciones.

Tabla 11: Porcentaje de casos de TB con información de evaluación del tratamiento por jurisdicción y antecedente de tratamiento. Argentina, 2014.


Jurisdicción	Total de casos notificados	Nuevos/Recaídas			No nuevos		
		Total	Casos con evaluación de tratamiento	Porcentaje de evaluados	Total	Casos con evaluación de tratamiento	Porcentaje de evaluados
Total País	10641	9709	6736	69,4	932	638	68,5
Buenos Aires	5274	4663	3004	64,4	611	427	69,9
CABA	1133	1073	230	21,4	60	10	16,7
Catamarca	23	22	18	81,8	1	0	0,0
Chaco	361	342	316	92,4	19	16	84,2
Chubut	81	76	73	96,1	5	4	80,0
Córdoba	316	310	287	92,6	6	6	100,0
Corrientes	259	235	205	87,2	24	21	87,5
Entre Ríos	210	195	184	94,4	15	13	86,7
Formosa	224	209	205	98,1	15	11	73,3
Jujuy	341	328,0	312	95,1	13	8	61,5
La Pampa	40	37,0	36	97,3	3	3	100,0
La Rioja	34	30	10	33,3	4	0	0,0
Mendoza	190	173	168	97,1	17	16	94,1
Misiones	242	236	233	98,7	6	5	83,3
Neuquén	59	55	40	72,7	4	3	75,0
Río Negro	48	45	28	62,2	3	1	33,3
Salta	615	599	517	86,3	16	13	81,3
San Juan	60	58	53	91,4	2	2	100,0
San Luis	30	28	24	85,7	2	0	0,0
Santa Cruz	70	55	52	94,5	15	13	86,7
Santa Fe	604	561	484	86,3	43	37	86,0
Santiago del Estero	124	110	84	76,4	14	12	85,7
Tierra del Fuego	23	21	12	57,1	2	2	100,0
Tucumán	214	193	148	76,7	21	13	61,9
Sin información	66	55	13	23,6	11	2	18,2

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2016.

Tal como se observa en la figura 8, en la mayor parte de las jurisdicciones, incluyendo el total del país, la proporción de éxito sobre el total de casos evaluados fue mayor en los casos nuevos y recaídas, exceptuando en, Río Negro, Tierra del Fuego, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Santa Cruz y Misiones donde se presenta la situación opuesta.

El éxito del tratamiento en casos nuevos y recaídas de TB de todas las formas presenta un rango del 92,9% en la provincia de Río Negro al 72,1% en la provincia de Santa Cruz.


Más del 50% de las provincias presentaron una proporción de éxito mayor al 80% sobre el total de casos evaluados. Entre las jurisdicciones restantes que no alcanzaron el 80% de éxito entre los casos nuevos se encuentran Buenos Aires y CABA que en conjunto aportaron el 59,1% de casos nuevos y recaídas.



En referencia al éxito en los casos con antecedente de tratamiento, cuatro jurisdicciones: Río Negro, Tierra del Fuego, La Pampa y Córdoba presentaron 100% de éxito, pero debe ser tenido en cuenta que Río Negro evaluó el 33,3% de los casos, mientras que Tierra del Fuego, La Pampa y Córdoba el 100%. La ausencia de casos tratados con éxito en San Luis, La Rioja, Catamarca se debe a que los casos con tratamiento anterior de estas provincias no contaban con evaluación de tratamiento. Chubut y Neuquén si bien presentaron escasos casos sólo uno tenía registrado el resultado del tratamiento.

Las jurisdicciones que aportaron más casos con antecedentes de tratamiento fueron Buenos Aires, CABA y Santa Fe, las cuales no superaron el 65% de éxito, presentando porcentajes de 61,4%, 40% y 35,1%, de los casos evaluados respectivamente.

En la figura 9 se presenta la distribución de las jurisdicciones según su porcentaje de abandono y antecedente de tratamiento. El abandono para el total del país fue del 14,2% en casos nuevos y recaídas y del 30,3% para casos retratados.



Entre los casos nuevos y recaídas, la proporción de abandono del tratamiento presentó un rango de 19,8% en Buenos Aires a 0% en cinco provincias (Tierra del Fuego, San Luis, Río Negro, La Rioja y Catamarca) todas con una evaluación de resultado de tratamiento superior al 50%, exceptuando La Rioja que presentaba el 33,3% de evaluación del tratamiento.


A nivel nacional, los casos no nuevos presentaron más del doble de abandono en comparación a los casos nuevos y recaídas ($p < 0,001$), alcanzando el 30%. Las tres jurisdicciones que presentaron los mayores porcentajes de abandono entre casos nuevos y recaídas fueron Buenos Aires, Formosa y CABA. En los casos con antecedentes de tratamiento las provincias con mayor porcentaje de abandono fueron Chubut, Tucumán y CABA, con un porcentaje mayor al 50% de abandono.

En la figura 10 se presenta la distribución de la mortalidad por jurisdicción. Existen grandes diferencias en la mortalidad entre casos nuevos y recaídas y casos con retratamiento por jurisdicción pero debido al redujo número de fallecidos en esta última categoría (casos con historia previa de tratamiento) no fue incluida en la gráfica.

Entre los casos nuevos y recaídas el promedio nacional fue de 7,7%, y 17 jurisdicciones superan ese promedio: CABA, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Corrientes, Misiones, La Rioja, Chaco, Córdoba, Salta, Jujuy, Neuquén, Chubut, Catamarca, Santa Cruz, San Juan.

En referencia a los casos retratados, la media nacional fue de 6,9%, sin ser diferente a los casos nuevos y recaídas ($p = 0,623$) y 14 jurisdicciones no presentaron casos no nuevos que fallecieron durante el tratamiento. Las jurisdicciones con mayor mortalidad entre estos pacientes fueron San Luis, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones y Chaco con un con un porcentaje de fallecidos que va de 18,8% al 100%, es necesario aclarar que el 100% de fallecidos corresponde a la provincia de San Juan que tenía un sólo caso con evaluación de tratamiento (datos no mostrados).

Figura 10: Porcentaje de casos nuevos y recaídas que fallece en el tratamiento por jurisdicción. Casos de TB todas las formas. Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2016.

4.7. Grupos de riesgo

La evaluación del tratamiento para casos con resistencia a las drogas se observa en la tabla 12. Los casos resistentes representaron el 1,6% del total de casos notificados. Entre ellos, la evaluación del tratamiento fue del 49,1%, presentándose un tratamiento exitoso en el 58,1% de los casos. El 25,7% de los casos resistentes eran casos no nuevos, cifra que triplica el porcentaje de casos no nuevos para el total de casos notificados (8,7%) y el 27,8% de los casos resistentes retratados fueron reingreso de abandono.

Tabla 12: Resultados del tratamiento para los casos de TB todas las formas según sensibilidad al tratamiento. Argentina, 2014

Modalidad de tratamiento	TOTAL	Resistente				Sensible				Sin Información			
		Nuevos/Recaídas		Retratamiento		Nuevos/Recaídas		Retratamiento		Nuevos/Recaídas		Retratamiento	
		n	%	n	%	N	%	n	%	n	%	N	%
Total	10641	130	1,2	45	0,4	147	1,4	20	0,2	9432	88,6	867	8,1
Evaluados¹	7374	68	52,3	18	40,0	60	40,8	10	50,0	6608	70,1	610	70,4
Éxito²	5653	42	61,8	8	44,4	40	66,7	5	50,0	5172	78,3	386	63,3
Abandono²	1148	17	25,0	5	27,8	14	23,3	5	50,0	924	14,0	183	30,0
Fallecido²	561	9	13,2	5	27,8	6	10,0	0	0,0	502	7,6	39	6,4
Fracaso²	12	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	0,2	2	0,3
No evaluados¹	3267	62	47,7	27	60,0	87	59,2	10	50,0	2824	29,9	257	29,6
Traslado³	381	4	6,5	3	11,1	12	13,8	3	30,0	317	11,2	42	16,3
Sin Información³	2886	58	93,5	24	88,9	75	86,2	7	70,0	2507	88,8	215	83,7

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

³ Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

Fuente: INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2016.

El 50% de los casos resistentes no tenían evaluado el tratamiento. Esta proporción es mayor en los casos con retratamiento (60%) que en los casos nuevos-recaídas. La tasa de éxito en los casos de TB nuevos-recaídas fue 15 puntos superior a la observada en los casos con retratamiento (44,4%). En este grupo de casos no se observaron diferencias significativas en el abandono entre nuevos-recaídas y no nuevos ($p=0,9403$) y si bien la mortalidad es el doble en los casos no nuevos, la baja frecuencia de este evento en ambos grupos no permite determinar que esta diferencia sea significativa ($p=0,2597$).

Del total de casos resistentes ($n=130$) un 70,0% (91 casos) presentaron multidrogoresistencia (MDR), el 86,8% de estos eran casos nuevos o recaídas y entre ellos la evaluación de tratamiento fue del 41,8%, mientras que para los casos con antecedentes de tratamiento la evaluación del tratamiento fue del 100,0% (tabla 13).

Tabla 13: Resultados del tratamiento para los casos de TB MDR. Argentina, 2014.

Resultado de Tratamiento	Multidrogoresistencia				
	Total	Nuevo/Recaída		Retratamiento	
		n	%	n	%
Total	91	79	86,8	12	13,2
Evaluados¹	45	33	41,8	12	100,0
Éxito²	24	18	54,5	6	50,0
Abandono²	12	9	27,3	3	25,0
Fallecido²	9	6	18,2	3	25,0
Fracaso²	0	0	0,0	0	0,0
No evaluados¹	46	46	58,2	0	0,0
Traslado³	3	3	6,5	0	0,0
Sin Información³	43	43	93,5	0	0,0

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

³ Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

Fuente: INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2016.

El porcentaje de abandono tanto para los casos incidentes como para los retratados fue aproximadamente del 25,0%.

En la tabla 14 se presenta el resultado de tratamiento para casos que estuvieron privados de libertad, que representaron el 2,0% de los casos notificados como nuevos-recaídas, contándose con evaluación de tratamiento en el 38,2% de los casos. Entre los evaluados, el éxito fue del 86,4%, mayor a lo presentado para los casos sin privación de libertad, aunque esta diferencia no fue estadísticamente significativa ($p=0,30$). El porcentaje de casos de abandono duplicó el de los casos no carcelarios, tanto para nuevos-recaídas como para retratamientos, con una diferencia estadísticamente significativa ($p<0,001$).

Al comparar la mortalidad de los casos incidentes privados de la libertad se observó que el porcentaje fue similar a la de los casos incidentes no privados de la libertad ($p=0,86$).

El 83,9% de los pacientes en instituciones carcelarias recibió tratamiento supervisado, con un porcentaje de éxito del 87,7%, cifra que fue mayor al éxito entre quienes recibieron tratamiento autoadministrado, que fue del 47,0%, con diferencia significativa ($p=0,034$).

Tabla 14: Resultado de tratamiento para los casos de TB todas las formas según privación de libertad. Argentina, 2014

Modalidad de tratamiento	TOTAL	Privado de libertad				No privado de libertad			
		Nuevos/Recaídas		Retratamiento		Nuevos/Recaídas		Retratamiento	
		n	%	n	%	n	%	n	%
Total	10641	212	2,0	34	0,3	9497	89,2	898	8,4
Evaluados ¹	7374	81	38,2	9	26,5	6655	70,1	629	70,0
Éxito ²	5653	70	86,4	8	88,9	5184	77,9	391	62,2
Abandono ²	1148	4	4,9	1	11,1	951	14,3	192	30,5
Fallecido ²	561	7	8,6	0	0,0	510	7,7	44	7,0
Fracaso ²	12	0	0,0	0	0,0	10	0,2	2	0,3
No evaluados ¹	3267	131	61,8	25	73,5	2842	29,9	269	30,0
Traslado ³	381	11	8,4	2	8,0	322	11,3	46	17,1
Sin Información ³	2886	120	91,6	23	92,0	2520	88,7	223	82,9

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

³ Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

Fuente: INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2016.

Finalmente, en la tabla 15 se presentan los resultados de evaluación de tratamiento para los casos HIV (+). Del total de casos notificados, más de 8.000 no tuvieron indicado el resultado del examen para HIV, es decir que se cuenta con información solamente de 1816 casos (17,1%). La coinfección TB/HIV estuvo presente en el 30,3% (550 casos) de los casos que realizaron el test y el 68,9% de estos cuenta con evaluación del tratamiento. En este grupo de riesgo se destaca que la mortalidad alcanzó el 28,8% de los casos evaluados: un caso con la coinfección TB/HIV presentó 5,15 veces el riesgo de muerte que un caso con HIV (-) (RR=6,5; IC: 4,61-9,10).

El abandono de tratamiento también fue superior a lo reportado por casos sin coinfección TB/HIV, mientras que el éxito del tratamiento, consecuentemente, fue inferior a lo reportado por el total de casos notificados con evaluación de tratamiento.

El 46,8% de los pacientes estuvo bajo modalidad de tratamiento autoadministrada y sobre el total de casos evaluados, el éxito fue del 53,6%. Entre los casos evaluados con modalidad supervisada o mixta el éxito fue del 51,8%, por lo que no se observan diferencias según modalidad en este grupo de pacientes.

Tabla 15: Resultado de tratamiento para los casos de TB todas las formas según coinfección TB/HIV. Argentina, 2014

Modalidad de tratamiento	TOTAL	HIV (+)				HIV (-)				Sin Información			
		Nuevos/recaídas		Retratamiento		Nuevos/recaídas		Retratamiento		Nuevos/recaídas		Retratamiento	
		n	%	n	%	n	%	N	%	n	%	n	%
Total	10641	485	4,6	65	0,6	1129	10,6	137	1,3	8095	76,1	730	6,9
Evaluados ¹	7374	335	69,1	44	67,7	931	82,5	106	77,4	5470	67,6	488	66,8
Éxito ²	5653	175	52,2	19	17,9	790	84,9	68	64,2	4289	78,4	312	63,9
Abandono ²	1148	60	17,9	14	13,2	98	10,5	30	28,3	797	14,6	149	30,5
Fallecido ²	561	98	29,3	11	10,4	42	4,5	8	7,5	377	6,9	25	5,1
Fracaso ²	12	2	0,6	0	0,0	1	0,1	0	0,0	7	0,1	2	0,4
No evaluados ¹	3267	150	30,9	21	32,3	198	17,5	31	22,6	2625	32,4	242	33,2
Traslado ³	381	18	12,0	1	4,8	56	28,3	7	22,6	259	9,9	40	16,5
Sin Información ³	2886	132	88,0	20	95,2	142	71,7	24	77,4	2366	90,1	202	83,5

¹ Porcentaje sobre el total de casos

² Porcentaje sobre el total de casos con información del resultado de tratamiento.

³ Porcentaje sobre el total de casos sin información del resultado de tratamiento.

Fuente: INER "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre de 2015


4.9. Análisis de la tendencia del resultado del tratamiento

La evaluación del tratamiento de los casos de TB en Argentina se realiza desde el año 1978 aunque, al principio sólo se evaluaba una muestra de casos pulmonares BK(+). La evaluación del total de los casos se inició a partir de 1996, lo que explica el aumento en los porcentajes evaluados.

A fin de comparar los datos de 2013 con la serie histórica se presenta la evaluación del tratamiento de los casos nuevos y recaídas de TB pulmonar BK(+) y TB todas las formas a partir del año 2010. Para hacerla comparable con los últimos años, se recalculó toda la serie con la inclusión, como casos no evaluados, de aquellos clasificados como traslado en la evaluación del tratamiento. Esta corrección se refleja en una disminución de los casos evaluados en los años analizados en comparación a publicaciones anteriores.


En la figura 11 se observa la evolución de cobertura de información de los resultados del tratamiento de los casos de TB Pulmonar BK(+) en Argentina desde 1978 y TB todas las formas desde 2010. El porcentaje de evaluados tiene un aumento importante en los años siguiente a la implementación de la evaluación del total de casos notificados: de 14,8% en 1995 hasta cerca del 70,0% en 1998. Desde ese año, la evaluación del tratamiento ha sido cercana al 70%, alcanzando un máximo en 2007, con una cobertura de información del 82,3%.

Figura 11: Porcentaje de casos nuevos y recaídas de TB pulmonar BK(+) y todas las formas con evaluación de tratamiento. Argentina. 1978 – 2014, 2010 – 2014.



En la figura 12 se presenta la evolución de tratamiento de los tres principales resultados: éxito, abandono y mortalidad, siendo que los fracasos no se incluyen en el análisis por que representan escasos casos. Igualmente se menciona que este último resultado de tratamiento (fracaso) ha descendido de 2,4% en el 1978 a 0,2% en el 2013, sobre el total de casos Pulmonar BK (+).

Figura 12: Porcentaje de casos nuevos y recaídas de TB pulmonar BK(+) para con evaluación de tratamiento. Argentina. 1978 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2016.

Históricamente, el éxito en el tratamiento ha sido el resultado más frecuente, con respecto a TB todas las formas se observa que de 2010 a 2014 el porcentaje de éxito se mantiene alrededor del 76,0%-77,0%. Para los casos Pulmonar BK (+) se ve un incremento de un 58,9% en 1978 a 76,7% en el año 2014. Este aumento ha sido expensas fundamentalmente de la reducción del abandono de tratamiento, que en 2014 presenta un porcentaje que equivale al 50% de la presentada en el año 1978. El abandono presentó un descenso marcado entre 1978 y 2000, alcanzando uno de sus valores más bajos de 9,4%, en los últimos 10 años se observó un aumento alcanzando el 16,4% en 2013. Para TB toda la forma se observa que desde el 2010 hasta el 2014 el porcentaje de abandono se mantiene entre el 15,0% y 17,0%.

Finalmente, la mortalidad por TB Pulmonares BK (+) se ha incrementado desde 1978, de 3,07% a 7,23% en el 2014, que es hasta el momento la proporción más alta para este evento. Para los casos de TB toda la forma oscilo entre el 7, 0% y 9,0% en los años analizados.

5. Discusión y Conclusiones

En el año 2014 se notificaron 10.641 de los cuales 3.267 casos no contaron con la evaluación del tratamiento lo que representa que en 1 de 3 casos no se cuenta con la información sobre el desenlace del tratamiento, lo que determina que análisis no sea de la calidad esperada y no refleje totalmente la situación del tratamiento de la TB en el país. Es importante insistir con la recuperación de la información sobre los casos lo que permitirá un mejor conocimiento de la situación y así poder reorientar estrategias que ayuden a reducir la transmisión de la TB en la comunidad.

Los casos clasificados como nuevos-recaídas presentaron resultados de tratamiento mejores que los casos no nuevos. Esto se vio reflejado en el hecho de que el riesgo de un resultado no exitoso entre los casos retratados (excluyendo recaídas) fue un 98% mayor que en los casos nuevos-recaídas (RR: 1,98; 1,70- 2,30). Los casos nuevos contaron con las tasas más altas de éxito del tratamiento y las más bajas de abandonos, mientras que los casos reingresos de abandonos contaron con las tasas de éxito más bajas y las de abandono más altas. Cabe destacar que estos últimos corresponden a categorías con mayor riesgo de desarrollar resistencia a los fármacos, con la consiguiente dificultad para su tratamiento y control. Esto resalta la importancia de realizar un tratamiento correcto ante un primer diagnóstico de TB, tanto para alcanzar el objetivo de una curación del individuo como para prevenir la trasmisión de cepas resistentes.

También se observó diferencias entre los resultados del tratamiento entre localizaciones. Si bien el riesgo de abandonar el tratamiento fue similar cuando se compararon los pacientes con TB extrapulmonar con pulmonares RR: 1,04 (0,86-1,27) y BK(+) con BK(-)/NR RR: 0,95 (0,82-1,10), la proporción de casos que fallecieron fue 35,9% mayor en el grupo de casos de TB extrapulmonar que en los pulmonares ($p < 0.01$), esto podría ser consecuencia de la inclusión en esta categoría de las formas extrapulmonares graves como TB meníngea y diseminada. Por otro lado, esta categoría presentó un porcentaje de fallecidos mayor que las categorías de modalidad de tratamiento mixto y autoadministrado, lo que podría ser consecuencia de que los casos más graves de TB generalmente llevan a cabo su tratamiento bajo esta modalidad o la recuperación de los casos que fallece es mejor cuando se hace un seguimiento del tratamiento. Estos datos parecen confirmar que la modalidad supervisada consiste en la mejor estrategia de tratamiento que se puede adoptar, a pesar de las críticas que enfrenta respecto a las dificultades operativas de llevarla a la práctica.

La evaluación del resultado de tratamiento y porcentajes de éxito en el tratamiento de la TB continúa siendo heterogénea en el país, presentando marcadas diferencias entre jurisdicciones. Se destaca que las provincias con mayor densidad poblacional y con mayor número de casos, no tienen coberturas óptimas de evaluación del tratamiento estas son Buenos Aires y particularmente CABA que al no estar integrada totalmente al SNVS -TB informa coberturas debajo del 30% de los casos notificados.

La tendencia del éxito como resultado del tratamiento de la TB se ha mantenido estable los últimos años, pero a un nivel por debajo de la meta propuesta de tratar exitosamente al 85,0% de los casos con TB.

El análisis de la información de tratamiento de los casos de TB es de gran utilidad para el seguimiento de las acciones del programa de control, pero debe ser tenido en cuenta que los resultados pueden ser erróneos si la cobertura de información no es completa. Para lograr una correcta evaluación de los logros en materia de control de la TB, es perentoria la información completa sobre el seguimiento de pacientes, por lo que sigue siendo una prioridad esencial del país que todos los casos de TB tengan realizada su evaluación al completar el tratamiento.

Tablas y Gráficos para el País y sus Jurisdicciones

1. Argentina

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	4526	N/A	N/A	4918	N/A	N/A
Evaluados ³	3554	78,52	N/A	3120	63,44	N/A
Éxito	2860	63,19	80,47	2358	47,95	75,58
Abandono	338	7,47	9,51	606	12,32	19,42
Fallecido	355	7,84	9,99	147	2,99	4,71
Fracaso	1	0,02	0,03	9	0,18	0,29
Traslado	124	2,74	N/A	206	4,19	N/A
Pendientes	848	18,74	N/A	1592	32,37	N/A


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+ Abandono+ Fallecido+ Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.
República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	314	230	73,2	36	15,7	161	70,0	30	13,0	3	1,3	0	0,0	13	4,1
5 - 9	258	189	73,3	36	19,0	131	69,3	19	10,1	3	1,6	0	0,0	9	3,5
10 - 14	310	199	64,2	40	20,1	133	66,8	25	12,6	1	0,5	0	0,0	9	2,9
15 - 19	957	637	66,6	146	22,9	376	59,0	107	16,8	7	1,1	1	0,2	41	4,3
20 - 24	1227	813	66,3	203	25,0	438	53,9	151	18,6	20	2,5	1	0,1	51	4,2
25 - 29	1154	763	66,1	193	25,3	415	54,4	126	16,5	28	3,7	1	0,1	45	3,9
30 - 34	975	645	66,2	167	25,9	354	54,9	90	14,0	34	5,3	0	0,0	44	4,5
35 - 44	1456	978	67,2	206	21,1	523	53,5	155	15,8	92	9,4	2	0,2	44	3,0
45 - 54	1109	805	72,6	190	23,6	434	53,9	94	11,7	83	10,3	4	0,5	30	2,7
55 - 64	989	732	74,0	175	23,9	383	52,3	82	11,2	91	12,4	1	0,1	28	2,8
65 - 74	552	435	78,8	100	23,0	203	46,7	53	12,2	79	18,2	0	0,0	9	1,6
75 y más	363	293	80,7	82	28,0	117	39,9	21	7,2	73	24,9	0	0,0	8	2,2
S/E	45	17	37,8	2	11,8	10	58,8	2	11,8	3	17,6	0	0,0	2	4,4
Total	9709	6736	69,4	1576	23,4	3678	54,6	955	14,2	517	7,7	10	0,1	333	3,4

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por jurisdicción. Ambos Sexos. República Argentina, 2014.

Jurisdicción de residencia habitual	Casos	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecido			Fracaso			TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹
Total Argentina	9709	6736	69,4	5254	54,1	78,0	955	9,8	14,2	517	5,3	7,7	10	0,1	0,1	4526	46,6
Buenos Aires	4663	3004	64,4	2247	48,2	74,8	596	12,8	19,8	153	3,3	5,1	8	0,2	0,3	872	18,7
C. de Buenos Aires	1073	230	21,4	170	15,8	73,9	41	3,8	17,8	18	1,7	7,8	1	0,1	0,4	294	27,4
Catamarca	22	18	81,8	15	68,2	83,3	0	0,0	0,0	3	13,6	16,7	0	0,0	0,0	22	100,0
Chaco	342	316	92,4	239	69,9	75,6	45	13,2	14,2	32	9,4	10,1	0	0,0	0,0	256	74,9
Chubut	76	73	96,1	59	77,6	80,8	3	3,9	4,1	11	14,5	15,1	0	0,0	0,0	72	94,7
Córdoba	310	287	92,6	237	76,5	82,6	20	6,5	7,0	30	9,7	10,5	0	0,0	0,0	238	76,8
Corrientes	235	205	87,2	168	71,5	82,0	18	7,7	8,8	19	8,1	9,3	0	0,0	0,0	190	80,9
Entre Ríos	195	184	94,4	159	81,5	86,4	13	6,7	7,1	12	6,2	6,5	0	0,0	0,0	127	65,1
Formosa	209	205	98,1	153	73,2	74,6	40	19,1	19,5	12	5,7	5,9	0	0,0	0,0	168	80,4
Jujuy	328	312	95,1	252	76,8	80,8	15	4,6	4,8	45	13,7	14,4	0	0,0	0,0	304	92,7
La Pampa	37	36	97,3	33	89,2	91,7	1	2,7	2,8	2	5,4	5,6	0	0,0	0,0	36	97,3
La Rioja	30	10	33,3	9	30,0	90,0	0	0,0	0,0	1	3,3	10,0	0	0,0	0,0	30	100,0
Mendoza	173	168	97,1	153	88,4	91,1	6	3,5	3,6	9	5,2	5,4	0	0,0	0,0	169	97,7
Misiones	236	233	98,7	179	75,8	76,8	32	13,6	13,7	22	9,3	9,4	0	0,0	0,0	74	31,4
Neuquén	55	40	72,7	29	52,7	72,5	5	9,1	12,5	6	10,9	15,0	0	0,0	0,0	39	70,9
Río Negro	45	28	62,2	26	57,8	92,9	0	0,0	0,0	2	4,4	7,1	0	0,0	0,0	39	86,7
Salta	599	517	86,3	428	71,5	82,8	30	5,0	5,8	59	9,8	11,4	0	0,0	0,0	587	98,0
San Juan	58	53	91,4	40	69,0	75,5	2	3,4	3,8	11	19,0	20,8	0	0,0	0,0	57	98,3

Jurisdicción de residencia habitual	Casos	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecido			Fracaso			TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹
San Luis	28	24	85,7	22	78,6	91,7	0	0,0	0,0	2	7,1	8,3	0	0,0	0,0	28	100,0
Santa Cruz	55	52	94,5	37	67,3	71,2	6	10,9	11,5	9	16,4	17,3	0	0,0	0,0	53	96,4
Santa Fe	561	484	86,3	385	68,6	79,5	60	10,7	12,4	39	7,0	8,1	0	0,0	0,0	520	92,7
Santiago del Estero	110	84	76,4	69	62,7	82,1	7	6,4	8,3	7	6,4	8,3	1	0,9	1,2	109	99,1
Tierra del Fuego	21	12	57,1	11	52,4	91,7	0	0,0	0,0	1	4,8	8,3	0	0,0	0,0	19	90,5
Tucumán	193	148	76,7	126	65,3	85,1	12	6,2	8,1	10	5,2	6,8	0	0,0	0,0	188	97,4
Extranjeros	0	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
S/E	55	13	23,6	8	14,5	61,5	3	5,5	23,1	2	3,6	15,4	0	0,0	0,0	35	63,6

Nota: 24 casos no tienen información sobre sexo, por lo que no se tuvieron en cuenta para la evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por jurisdicción para ambos sexos.

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por jurisdicción. Varones. República Argentina, 2014.

Jurisdicción de residencia habitual	Casos	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecido			Fracaso			TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹
Total Argentina	5589	3846	68,8	2.869	51,3	74,6	613	11,0	15,9	355	6,4	9,2	9	0,2	0,2	2586	46,3
Buenos Aires	2743	1773	64,6	1271	46,3	71,7	384	14,0	21,7	110	4,0	6,2	8	0,3	0,5	510	18,6
C. de Buenos Aires	615	131	21,3	90	14,6	68,7	30	4,9	22,9	10	1,6	7,6	1	0,2	0,8	191	31,1
Catamarca	15	12	80,0	11	73,3	91,7	0	0,0	0,0	1	6,7	8,3	0	0,0	0,0	15	100,0
Chaco	167	155	92,8	103	61,7	66,5	29	17,4	18,7	23	13,8	14,8	0	0,0	0,0	131	78,4
Chubut	34	33	97,1	24	70,6	72,7	1	2,9	3,0	8	23,5	24,2	0	0,0	0,0	32	94,1
Córdoba	185	166	89,7	135	73,0	81,3	13	7,0	7,8	18	9,7	10,8	0	0,0	0,0	144	77,8
Corrientes	131	114	87,0	93	71,0	81,6	8	6,1	7,0	13	9,9	11,4	0	0,0	0,0	105	80,2
Entre Ríos	121	117	96,7	93	76,9	79,5	13	10,7	11,1	11	9,1	9,4	0	0,0	0,0	78	64,5
Formosa	90	89	98,9	63	70,0	70,8	20	22,2	22,5	6	6,7	6,7	0	0,0	0,0	71	78,9
Jujuy	192	181	94,3	137	71,4	75,7	10	5,2	5,5	34	17,7	18,8	0	0,0	0,0	176	91,7
La Pampa	25	25	100,0	22	88,0	88,0	1	4,0	4,0	2	8,0	8,0	0	0,0	0,0	24	96,0
La Rioja	15	6	40,0	5	33,3	83,3	0	0,0	0,0	1	6,7	16,7	0	0,0	0,0	15	100,0
Mendoza	99	95	96,0	83	83,8	87,4	5	5,1	5,3	7	7,1	7,4	0	0,0	0,0	96	97,0
Misiones	139	139	100,0	105	75,5	75,5	20	14,4	14,4	14	10,1	10,1	0	0,0	0,0	45	32,4
Neuquén	33	25	75,8	16	48,5	64,0	4	12,1	16,0	5	15,2	20,0	0	0,0	0,0	23	69,7
Río Negro	21	13	61,9	12	57,1	92,3	0	0,0	0,0	1	4,8	7,7	0	0,0	0,0	21	100,0
Salta	310	258	83,2	206	66,5	79,8	19	6,1	7,4	33	10,6	12,8	0	0,0	0,0	302	97,4
San Juan	34	30	88,2	22	64,7	73,3	1	2,9	3,3	7	20,6	23,3	0	0,0	0,0	33	97,1
San Luis	18	16	88,9	14	77,8	87,5	0	0,0	0,0	2	11,1	12,5	0	0,0	0,0	18	100,0
Santa Cruz	30	30	100,0	19	63,3	63,3	4	13,3	13,3	7	23,3	23,3	0	0,0	0,0	30	100,0
Santa Fe	357	308	86,3	240	67,2	77,9	37	10,4	12,0	31	8,7	10,1	0	0,0	0,0	330	92,4
Santiago del Estero	59	43	72,9	32	54,2	74,4	6	10,2	14,0	5	8,5	11,6	0	0,0	0,0	58	98,3
Tierra del Fuego	16	9	56,3	8	50,0	88,9	0	0,0	0,0	1	6,3	11,1	0	0,0	0,0	15	93,8
Tucumán	96	70	72,9	60	62,5	85,7	7	7,3	10,0	3	3,1	4,3	0	0,0	0,0	92	95,8
Extranjeros	0	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-

Jurisdicción de residencia habitual	Casos	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecido			Fracaso			TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹
S/E	44	8	18,2	5	11,4	62,5	1	2,3	12,5	2	4,5	25,0	0	0,0	0,0	31	70,5

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por jurisdicción. Mujeres. República Argentina, 2014.

Jurisdicción de residencia habitual	Casos	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecido			Fracaso			TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹	% ²	N°	% ¹
Total Argentina	4096	2889	70,5	2384	58,2	82,5	342	8,3	11,8	162	4,0	5,6	1	0,0	0,0	1938	47,3
Buenos Aires	1901	1230	64,7	975	51,3	79,3	212	11,2	17,2	43	2,3	3,5	0	0,0	0,0	361	19,0
C. de Buenos Aires	454	99	21,8	80	17,6	80,8	11	2,4	11,1	8	1,8	8,1	0	0,0	0,0	103	22,7
Catamarca	7	6	85,7	4	57,1	66,7	0	0,0	0,0	2	28,6	33,3	0	0,0	0,0	7	100,0
Chaco	175	161	92,0	136	77,7	84,5	16	9,1	9,9	9	5,1	5,6	0	0,0	0,0	125	71,4
Chubut	42	40	95,2	35	83,3	87,5	2	4,8	5,0	3	7,1	7,5	0	0,0	0,0	40	95,2
Córdoba	125	121	96,8	102	81,6	84,3	7	5,6	5,8	12	9,6	9,9	0	0,0	0,0	94	75,2
Corrientes	104	91	87,5	75	72,1	82,4	10	9,6	11,0	6	5,8	6,6	0	0,0	0,0	85	81,7
Entre Ríos	74	67	90,5	66	89,2	98,5	0	0,0	0,0	1	1,4	1,5	0	0,0	0,0	49	66,2
Formosa	119	116	97,5	90	75,6	77,6	20	16,8	17,2	6	5,0	5,2	0	0,0	0,0	97	81,5
Jujuy	136	131	96,3	115	84,6	87,8	5	3,7	3,8	11	8,1	8,4	0	0,0	0,0	128	94,1
La Pampa	12	11	91,7	11	91,7	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	12	100,0
La Rioja	14	4	28,6	4	28,6	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	14	100,0
Mendoza	74	73	98,6	70	94,6	95,9	1	1,4	1,4	2	2,7	2,7	0	0,0	0,0	73	98,6
Misiones	97	94	96,9	74	76,3	78,7	12	12,4	12,8	8	8,2	8,5	0	0,0	0,0	29	29,9
Neuquén	22	15	68,2	13	59,1	86,7	1	4,5	6,7	1	4,5	6,7	0	0,0	0,0	16	72,7
Río Negro	24	15	62,5	14	58,3	93,3	0	0,0	0,0	1	4,2	6,7	0	0,0	0,0	18	75,0
Salta	289	259	89,6	222	76,8	85,7	11	3,8	4,2	26	9,0	10,0	0	0,0	0,0	285	98,6
San Juan	24	23	95,8	18	75,0	78,3	1	4,2	4,3	4	16,7	17,4	0	0,0	0,0	24	100,0
San Luis	10	8	80,0	8	80,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	10	100,0
Santa Cruz	25	22	88,0	18	72,0	81,8	2	8,0	9,1	2	8,0	9,1	0	0,0	0,0	23	92,0
Santa Fe	204	176	86,3	145	71,1	82,4	23	11,3	13,1	8	3,9	4,5	0	0,0	0,0	190	93,1
Santiago del Estero	51	41	80,4	37	72,5	90,2	1	2,0	2,4	2	3,9	4,9	1	2,0	2,4	51	100,0
Tierra del Fuego	5	3	60,0	3	60,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	4	80,0
Tucumán	97	78	80,4	66	68,0	84,6	5	5,2	6,4	7	7,2	9,0	0	0,0	0,0	96	99,0
Extranjeros	0	0	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-
S/E	11	5	45,5	3	27,3	60,0	2	18,2	40,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	4	36,4


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+ Mixto)


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Porcentaje de éxito en el tratamiento de casos de tuberculosis por jurisdicción. República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por jurisdicción. Porcentaje de evaluación y éxito. República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	9671	6254	64,67	4873	77,92	906	14,49	17	0,27	458	7,32	333	3,44	4876	50,42
2011	9860	6693	67,88	5232	78,17	941	14,06	15	0,22	505	7,55	448	4,54	4924	49,94
2012	9270	6900	74,43	5376	77,91	1061	15,38	10	0,14	453	6,57	361	3,89	4474	48,26
2013	9068	6029	66,49	4740	78,62	769	12,76	6	0,10	514	8,53	332	3,66	4427	48,82
2014	9709	6736	69,38	5254	78,00	955	14,18	10	0,15	517	7,68	333	3,43	4526	46,62

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado + Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

2. Buenos Aires

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	872	N/A	N/A	3607	N/A	N/A
Evaluados ³	548	62,8	N/A	2414	66,9	N/A
Éxito	429	49,2	78,3	1792	49,7	74,2
Abandono	80	9,2	14,6	506	14,0	21,0
Fallecido	39	4,5	7,1	108	3,0	4,5
Fracaso	0	0,0	0,0	8	0,2	0,3
Traslado	44	5,0	N/A	155	4,3	N/A
Pendientes	280	32,1	N/A	1038	28,8	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos. Buenos Aires, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	160	104	65,0	5	4,8	79	76,0	19	18,3	1	1,0	0	0,0	11	6,9
5 - 9	130	84	64,6	5	6,0	65	77,4	14	16,7	0	0,0	0	0,0	9	6,9
10 - 14	161	99	61,5	16	16,2	67	67,7	15	15,2	1	1,0	0	0,0	5	3,1
15 - 19	496	339	68,3	55	16,2	210	61,9	71	20,9	2	0,6	1	0,3	20	4,0
20 - 24	639	408	63,8	79	19,4	222	54,4	101	24,8	5	1,2	1	0,2	26	4,1
25 - 29	612	385	62,9	71	18,4	220	57,1	84	21,8	9	2,3	1	0,3	23	3,8
30 - 34	481	282	58,6	64	22,7	153	54,3	52	18,4	13	4,6	0	0,0	31	6,4
35 - 44	732	456	62,3	73	16,0	254	55,7	94	20,6	33	7,2	2	0,4	29	4,0
45 - 54	513	348	67,8	58	16,7	201	57,8	59	17,0	27	7,8	3	0,9	19	3,7
55- 64	426	296	69,5	48	16,2	172	58,1	51	17,2	25	8,4	0	0,0	16	3,8
65 - 74	192	134	69,8	21	15,7	64	47,8	24	17,9	25	18,7	0	0,0	6	3,1
75 y más	94	65	69,1	15	23,1	28	43,1	11	16,9	11	16,9	0	0,0	4	4,3
S/E	27	4	14,8	0	0,0	2	50,0	1	25,0	1	25,0	0	0,0	2	7,4
Total	4663	3004	64,4	510	17,0	1737	57,8	596	19,8	153	5,1	8	0,3	201	4,3

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹	N°	% ¹
2010	4500	2549	56,6	1873	73,5	541	21,2	4	0,2	131	5,1	188	4,2	930	20,7
2011	4628	2680	57,9	1984	74,0	514	19,2	11	0,4	171	6,4	276	6,0	954	20,6
2012	4247	2908	68,5	2168	74,6	598	20,6	6	0,2	136	4,7	201	4,7	753	17,7
2013	4034	2277	56,4	1721	75,6	426	18,7	4	0,2	126	5,5	187	4,6	742	18,4
2014	4663	3004	64,42	2247	74,80	596	19,84	8	0,27	153	5,09	201	4,31	872	18,70

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	294	N/A	N/A	729	N/A	N/A
Evaluados ³	39	13,3	N/A	190	26,1	N/A
Éxito	10	3,4	25,6	160	21,9	84,2
Abandono	18	6,1	46,2	22	3,0	11,6
Fallecido	11	3,7	28,2	7	1,0	3,7
Fracaso	0	0,0	0,0	1	0,1	0,5
Traslado	12	4,1	N/A	32	4,4	N/A
Pendientes	243	82,7	N/A	507	69,5	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	33	11	33,3	10	90,9	1	9,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	26	5	19,2	3	60,0	1	20,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	53	9	17,0	3	33,3	5	55,6	1	11,1	0	0,0	0	0,0	2	3,8
15 - 19	130	14	10,8	7	50,0	2	14,3	5	35,7	0	0,0	0	0,0	7	5,4
20 - 24	169	38	22,5	24	63,2	6	15,8	8	21,1	0	0,0	0	0,0	10	5,9
25 - 29	157	38	24,2	30	78,9	0	0,0	7	18,4	1	2,6	0	0,0	5	3,2
30 - 34	120	29	24,2	18	62,1	4	13,8	6	20,7	1	3,4	0	0,0	3	2,5
35 - 44	162	35	21,6	22	62,9	1	2,9	6	17,1	6	17,1	0	0,0	8	4,9
45 - 54	91	21	23,1	9	42,9	4	19,0	4	19,0	4	19,0	0	0,0	2	2,2
55- 64	81	19	23,5	8	42,1	5	26,3	3	15,8	2	10,5	1	5,3	5	6,2
65 - 74	33	7	21,2	2	28,6	1	14,3	1	14,3	3	42,9	0	0,0	1	3,0
75 y más	16	4	25,0	1	25,0	3	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,3
S/E	2	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
Total	1073	230	21,4	137	59,6	33	14,3	41	17,8	18	7,8	1	0,4	44	4,1

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹	N°	% ¹
2010	1079	144	13,3	78	54,2	51	35,4	0	0,0	15	10,4	45	4,2	324	30,0
2011	1154	341	29,5	219	64,2	96	28,2	0	0,0	26	7,6	67	5,8	424	36,7
2012	1145	415	36,2	272	65,5	126	30,4	2	0,5	15	3,6	73	6,4	354	30,9
2013	946	144	15,2	117	81,3	22	15,3	1	0,7	4	2,8	20	2,1	230	24,3
2014	1073	230	21,4	170	73,9	41	17,8	1	0,4	18	7,8	44	4,1	294	27,4

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

4. Catamarca

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	22	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Evaluados ³	18	81,8	N/A	0	-	N/A
Éxito	15	68,2	83,3	0	-	-
Abandono	0	0,0	0,0	0	-	-
Fallecido	3	13,6	16,7	0	-	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	-	-
Traslado	1	4,5	N/A	0	-	N/A
Pendientes	3	13,6	N/A	0	-	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	4	4	100,0	3	75,0	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	3	2	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	5	4	80,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55- 64	6	5	83,3	4	80,0	0	0,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	22	18	81,8	14	77,8	1	0,1	0	0,0	3	16,7	0	0,0	1	4,5

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	43	39	90,7	31	79,5	1	2,6	0	0,0	7	17,9	0	0,0	38	88,4
2011	35	33	94,3	33	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	5,7	32	91,4
2012	31	29	93,5	23	79,3	0	0,0	0	0,0	6	20,7	0	0,0	31	100,0
2013	36	28	77,8	23	82,1	1	3,6	0	0,0	4	14,3	4	11,1	36	100,0
2014	22	18	81,8	15	83,3	0	0,0	0	0,0	3	16,7	1	4,5	22	100,0

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

5. Córdoba

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	238	N/A	N/A	72	N/A	N/A
Evaluados ³	223	93,7	N/A	64	88,9	N/A
Éxito	183	76,9	82,1	54	75,0	84,4
Abandono	16	6,7	7,2	4	5,6	6,3
Fallecido	24	10,1	10,8	6	8,3	9,4
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	4	1,7	N/A	5	6,9	N/A
Pendientes	11	4,6	N/A	3	4,2	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento.
Provincia de Córdoba, República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 - 4	4	4	100,0	0	0,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	4	4	100,0	1	25,0	3	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	19	18	94,7	8	44,4	8	44,4	2	11,1	0	0,0	0	0,0	1	5,3
20 - 24	37	35	94,6	7	20,0	25	71,4	2	5,7	1	2,9	0	0,0	2	5,4
25 - 29	35	31	88,6	8	25,8	18	58,1	2	6,5	5	16,1	0	0,0	3	8,6
30 - 34	41	38	92,7	8	21,1	26	68,4	2	5,3	0	0,0	0	0,0	2	4,9
35 - 44	54	49	90,7	10	20,4	30	61,2	4	8,2	5	10,2	0	0,0	0	0,0
45 - 54	42	38	90,5	7	18,4	22	57,9	3	7,9	6	15,8	0	0,0	1	2,4
55- 64	36	33	91,7	6	18,2	19	57,6	2	6,1	6	18,2	0	0,0	0	0,0
65 - 74	22	22	100,0	7	31,8	12	54,5	2	9,1	1	4,5	0	0,0	0	0,0
75 y más	13	12	92,3	1	8,3	4	33,3	1	8,3	6	50,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	310	287	92,6	63	22,0	174	60,6	20	7,0	30	10,5	0	0,0	9	2,9

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	349	331	94,8	278	84,0	23	6,9	0	0,0	30	9,1	6	1,7	302	86,5
2011	337	320	95,0	278	86,9	24	7,5	0	0,0	18	5,6	15	4,5	277	82,2
2012	285	279	97,9	245	87,8	9	3,2	0	0,0	25	9,0	5	1,8	188	66,0
2013	313	298	95,2	258	86,6	17	5,7	0	0,0	23	7,7	14	4,5	225	71,9
2014	310	287	92,6	237	82,6	20	7,0	0	0,0	30	10,5	9	2,9	238	76,8

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2010 - 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

6. Corrientes

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total general	170	89,5	N/A	34	77,3	N/A
Evaluados ³	151	79,5	88,8	16	36,4	47,1
Éxito	2	1,1	1,2	16	36,4	47,1
Abandono	17	8,9	10,0	2	4,5	5,9
Fallecido	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Fracaso	2	1,1	1,2	1	2,3	N/A
Traslado	18	9,5	10,6	9	20,5	N/A
Pendientes	170	89,5	N/A	34	77,3	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.
Provincia de Corrientes, República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	4	3	75,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	6	5	83,3	0	0,0	5	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	21	19	90,5	0	0,0	17	89,5	2	10,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	17	17	100,0	0	0,0	16	94,1	1	5,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	24	21	87,5	0	0,0	18	85,7	3	14,3	0	0,0	0	0,0	1	4,2
30 - 34	19	17	89,5	0	0,0	14	82,4	1	5,9	2	11,8	0	0,0	0	0,0
35 - 44	30	26	86,7	1	3,8	20	76,9	1	3,8	4	15,4	0	0,0	1	3,3
45 - 54	35	29	82,9	3	10,3	19	65,5	4	13,8	3	10,3	0	0,0	1	2,9
55 - 64	35	29	82,9	0	0,0	23	79,3	2	6,9	4	13,8	0	0,0	0	0,0
65 - 74	32	28	87,5	0	0,0	18	64,3	4	14,3	6	21,4	0	0,0	0	0,0
75 y más	11	10	90,9	0	0,0	10	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	235	205	87,2	4	2,0	164	80,0	18	8,8	19	9,3	0	0,0	3	1,3

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Corrientes,
República Argentina, 2010 – 2014.**

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹	N°	% ¹
2010	249	218	87,6	172	78,9	34	15,6	0	0,0	12	5,5	2	0,8	247	99,2
2011	240	228	95,0	173	75,9	33	14,5	0	0,0	22	9,6	2	0,8	201	83,8
2012	253	240	94,9	188	78,3	31	12,9	0	0,0	21	8,8	7	2,8	234	92,5
2013	221	198	89,6	159	80,3	10	5,1	0	0,0	29	14,6	7	3,2	172	77,8
2014	235	205	87,2	168	82,0	18	8,8	0	0,0	19	9,3	3	1,3	190	80,9

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

7. Chaco

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	256	N/A	N/A	85	N/A	N/A
Evaluados ³	245	95,7	N/A	71	83,5	N/A
Éxito	187	73,0	76,3	52	61,2	73,2
Abandono	31	12,1	12,7	14	16,5	19,7
Fallecido	27	10,5	11,0	5	5,9	7,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	4	1,6	N/A	2	2,4	N/A
Pendientes	7	2,7	N/A	12	14,1	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 - 4	16	15	93,8	0	0,0	10	66,7	3	20,0	2	13,3	0	0,0	0	0,0
5 - 9	11	11	100,0	0	0,0	9	81,8	1	9,1	1	9,1	0	0,0	0	0,0
10 - 14	10	9	90,0	0	0,0	9	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	10,0
15 - 19	36	32	88,9	1	3,1	25	78,1	4	12,5	2	6,3	0	0,0	1	2,8
20 - 24	35	32	91,4	2	6,3	22	68,8	7	21,9	1	3,1	0	0,0	0	0,0
25 - 29	36	33	91,7	2	6,1	25	75,8	6	18,2	0	0,0	0	0,0	2	5,6
30 - 34	32	29	90,6	3	10,3	19	65,5	6	20,7	1	3,4	0	0,0	2	6,3
35 - 44	48	46	95,8	3	6,5	28	60,9	10	21,7	5	10,9	0	0,0	0	0,0
45 - 54	37	32	86,5	1	3,1	24	75,0	1	3,1	6	18,8	0	0,0	0	0,0
55 - 64	45	42	93,3	3	7,1	31	73,8	3	7,1	5	11,9	0	0,0	0	0,0
65 - 74	20	20	100,0	0	0,0	13	65,0	2	10,0	5	25,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	16	15	93,8	1	6,7	8	53,3	2	13,3	4	26,7	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	342	316	92,4	16	5,1	223	70,6	45	14,2	32	10,1	0	0,0	6	1,8

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Chaco, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	346	336	97,1	279	83,0	26	7,7	2	0,6	29	8,6	4	1,2	309	89,3
2011	318	316	99,4	262	82,9	31	9,8	1	0,3	22	7,0	1	0,3	271	85,2
2012	328	323	98,5	251	77,7	45	13,9	0	0,0	27	8,4	3	0,9	278	84,8
2013	341	336	98,5	272	81,0	25	7,4	0	0,0	39	11,6	4	1,2	285	83,6
2014	342	316	92,4	239	75,6	45	14,2	0	0,0	32	10,1	6	1,8	256	74,9

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Chaco, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

8. Chubut

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Chubut, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	72	N/A	N/A	2	N/A	N/A
Evaluados ³	70	97,2	N/A	2	100,0	N/A
Éxito	57	79,2	81,4	2	100,0	100,0
Abandono	3	4,2	4,3	0	0,0	0,0
Fallecido	10	13,9	14,3	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	2	2,8	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	14	19,4	N/A	0	0,0	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Chubut, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.
Provincia de Chubut, República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 - 4	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	4	3	75,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	25,0
15 - 19	4	4	100,0	2	50,0	2	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	10	10	100,0	6	60,0	4	40,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	8	8	100,0	7	87,5	0	0,0	0	0,0	1	12,5	0	0,0	0	0,0
30 - 34	9	8	88,9	5	62,5	1	12,5	1	12,5	1	12,5	0	0,0	0	0,0
35 - 44	12	12	100,0	7	58,3	4	33,3	0	0,0	1	8,3	0	0,0	0	0,0
45 - 54	14	13	92,9	10	76,9	1	7,7	1	7,7	1	7,7	0	0,0	1	7,1
55 - 64	4	4	100,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	2	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	7	7	100,0	2	28,6	1	14,3	0	0,0	4	57,1	0	0,0	0	0,0
S/E	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	76	73	96,1	45	61,6	14	19,2	3	4,1	11	15,1	0	0,0	2	2,6

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Chubut, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	91	70	76,9	52	74,3	8	11,4	1	1,4	9	12,9	7	7,7	90	98,9
2011	82	55	67,1	50	90,9	1	1,8	0	0,0	4	7,3	3	3,7	73	89,0
2012	68	55	80,9	49	89,1	2	3,6	0	0,0	4	7,3	3	4,4	65	95,6
2013	76	64	84,2	52	81,3	7	10,9	0	0,0	5	7,8	4	5,3	75	98,7
2014	76	73	96,1	59	80,8	3	4,1	0	0,0	11	15,1	2	2,6	72	94,7

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Chubut, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

9. Entre Ríos

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	127	N/A	N/A	65	N/A	N/A
Evaluados ³	117	92,1	N/A	64	98,5	N/A
Éxito	105	82,7	89,7	51	78,5	79,7
Abandono	4	3,1	3,4	9	13,8	14,1
Fallecido	8	6,3	6,8	4	6,2	6,3
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	2	1,6	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	8	6,3	N/A	1	1,5	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado + Abandono + Fallecido + Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 - 4	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	7	7	100,0	0	0,0	7	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	4	4	100,0	0	0,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	13	12	92,3	1	8,3	8	66,7	3	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	18	17	94,4	0	0,0	16	94,1	1	5,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	17	16	94,1	0	0,0	16	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	18	17	94,4	0	0,0	16	94,1	1	5,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	33	31	93,9	0	0,0	27	87,1	3	9,7	1	3,2	0	0,0	1	3,0
45 - 54	22	22	100,0	0	0,0	19	86,4	1	4,5	2	9,1	0	0,0	0	0,0
55 - 64	27	24	88,9	1	4,2	21	87,5	0	0,0	2	8,3	0	0,0	0	0,0
65 - 74	20	20	100,0	0	0,0	14	70,0	3	15,0	3	15,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	5	4	80,0	0	0,0	2	50,0	0	0,0	2	50,0	0	0,0	1	20,0
S/E	8	7	87,5	0	0,0	4	57,1	1	14,3	2	28,6	0	0,0	0	0,0
Total	195	184	94,4	2	1,1	157	85,3	13	7,1	12	6,5	0	0,0	2	1,0

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	199	144	72,4	120	83,3	18	12,5	0	0,0	6	4,2	4	2,0	127	63,8
2011	209	182	87,1	170	93,4	9	4,9	0	0,0	3	1,6	2	1,0	140	67,0
2012	195	184	94,4	157	85,3	24	13,0	0	0,0	3	1,6	4	2,1	147	75,4
2013	202	187	92,6	149	79,7	23	12,3	0	0,0	15	8,0	7	3,5	128	63,4
2014	195	184	94,4	159	86,4	13	7,1	0	0,0	12	6,5	2	1,0	127	65,1

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

10. Formosa

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Formosa, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	168	N/A	N/A	41	N/A	N/A
Evaluados ³	165	98,2	N/A	40	97,6	N/A
Éxito	126	75,0	76,4	27	65,9	67,5
Abandono	31	18,5	18,8	9	22,0	22,5
Fallecido	8	4,8	4,8	4	9,8	10,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	3	1,8	N/A	1	2,4	N/A
Pendientes	0	0,0	N/A	0	0,0	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Formosa, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.
Provincia de Formosa, República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	13	13	100,0	0	0,0	12	92,3	1	7,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	11	11	100,0	0	0,0	6	54,5	5	45,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	23	21	91,3	1	4,8	16	76,2	3	14,3	1	4,8	0	0,0	2	8,7
20 - 24	26	26	100,0	3	11,5	19	73,1	4	15,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	27	26	96,3	3	11,5	16	61,5	6	23,1	1	3,8	0	0,0	1	3,7
30 - 34	21	21	100,0	3	14,3	15	71,4	2	9,5	1	4,8	0	0,0	0	0,0
35 - 44	20	20	100,0	1	5,0	11	55,0	8	40,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	16	16	100,0	1	6,3	12	75,0	3	18,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55- 64	21	20	95,2	3	15,0	10	50,0	4	20,0	3	15,0	0	0,0	1	4,8
65 - 74	15	15	100,0	3	20,0	6	40,0	4	26,7	2	13,3	0	0,0	0	0,0
75 y más	13	13	100,0	1	7,7	8	61,5	0	0,0	4	30,8	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	209	205	98,1	19	9,3	134	65,4	40	19,5	12	5,9	0	0,0	4	1,9

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Formosa, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹	N°	% ¹
2010	239	166	69,5	141	84,9	15	9,0	0	0,0	10	6,0	3	1,3	220	92,1
2011	225	221	98,2	180	81,4	23	10,4	0	0,0	18	8,1	3	1,3	185	82,2
2012	199	193	97,0	144	74,6	31	16,1	0	0,0	18	9,3	6	3,0	169	84,9
2013	232	225	97,0	171	76,0	33	14,7	1	0,4	20	8,9	7	3,0	177	76,3
2014	209	205	98,1	153	74,6	40	19,5	0	0,0	12	5,9	4	1,9	168	80,4


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Formosa, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

11. Jujuy

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	304	N/A	N/A	16	N/A	N/A
Evaluados ³	289	95,1	N/A	16	100,0	N/A
Éxito	236	77,6	81,7	14	87,5	87,5
Abandono	14	4,6	4,8	1	6,3	6,3
Fallecido	39	12,8	13,5	1	6,3	6,3
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	10	3,3	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	5	1,6	N/A	0	0,0	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	2	2	100,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	6	6	100,0	3	50,0	3	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	6	6	100,0	5	83,3	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	29	28	96,6	20	71,4	6	21,4	1	3,6	1	3,6	0	0,0	1	3,4
20 - 24	34	31	91,2	22	71,0	7	22,6	2	6,5	0	0,0	0	0,0	3	8,8
25 - 29	21	18	85,7	10	55,6	5	27,8	2	11,1	1	5,6	0	0,0	2	9,5
30 - 34	29	27	93,1	19	70,4	5	18,5	2	7,4	1	3,7	0	0,0	1	3,4
35 - 44	40	35	87,5	21	60,0	7	20,0	2	5,7	5	14,3	0	0,0	3	7,5
45 - 54	33	31	93,9	20	64,5	4	12,9	0	0,0	7	22,6	0	0,0	1	3,0
55- 64	35	35	100,0	23	65,7	5	14,3	3	8,6	4	11,4	0	0,0	0	0,0
65 - 74	45	45	100,0	24	53,3	7	15,6	1	2,2	13	28,9	0	0,0	0	0,0
75 y más	48	48	100,0	27	56,3	6	12,5	2	4,2	13	27,1	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	328	312	95,1	194	62,2	58	18,6	15	4,8	45	14,4	0	0,0	11	3,4

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹	N°	% ¹
2010	335	325	97,0	269	82,8	9	2,8	5	1,5	42	12,9	7	2,1	296	88,4
2011	412	405	98,3	334	82,5	19	4,7	1	0,2	51	12,6	6	1,5	367	89,1
2012	348	340	97,7	283	83,2	12	3,5	1	0,3	44	12,9	7	2,0	318	91,4
2013	432	407	94,2	318	78,1	27	6,6	0	0,0	62	15,2	19	4,4	372	86,1
2014	328	312	95,1	252	80,8	15	4,8	0	0,0	45	14,4	11	3,4	304	92,7

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

12. La Pampa

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	36	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Evaluados ³	35	97,2	N/A	1	100,0	N/A
Éxito	32	88,9	91,4	1	100,0	100,0
Abandono	1	2,8	2,9	0	0,0	0,0
Fallecido	2	5,6	5,7	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	1	2,8	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	0	0,0	N/A	0	0,0	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.
Provincia de La Pampa, República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	2	2	100,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	2	2	100,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	2	2	100,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	3	3	100,0	2	66,7	1	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	4	3	75,0	1	33,3	1	33,3	1	33,3	0	0,0	0	0,0	1	25,0
35 - 44	5	5	100,0	2	40,0	3	60,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	8	8	100,0	6	75,0	2	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55- 64	4	4	100,0	2	50,0	1	25,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
75 y más	3	3	100,0	2	66,7	0	0,0	0	0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	37	36	97,3	17	47,2	16	44,4	1	2,8	2	5,6	0	0,0	1	2,7

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹	N°	% ¹
2010	44	43	97,7	40	93,0	3	7,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	40	90,9
2011	35	34	97,1	30	88,2	2	5,9	0	0,0	2	5,9	1	2,9	35	100,0
2012	40	38	95,0	34	89,5	2	5,3	0	0,0	2	5,3	2	5,0	40	100,0
2013	49	48	98,0	45	93,8	2	4,2	0	0,0	1	2,1	1	2,0	47	95,9
2014	37	36	97,3	33	91,7	1	2,8	0	0,0	1	2,8	1	2,7	36	97,3

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de evaluados, éxito y abandono. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

13. La Rioja

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	30	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Casos evaluados ³	10	33,3	N/A	0	-	N/A
Éxito	9	30,0	90,0	0	-	-
Abandono	0	0,0	0,0	0	-	-
Fallecido	1	3,3	10,0	0	-	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	-	-
Traslado	0	0,0	N/A	0	-	N/A
Pendientes	20	66,7	N/A	0	-	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.
Provincia de La Rioja, República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
20 - 24	4	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
30 - 34	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
35 - 44	3	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
45 - 54	5	1	20,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55 - 64	3	1	33,3	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	5	1	20,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	2	1	50,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
S/E	4	4	100,0	0	0,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	30	10	33,3	0	0,0	9	90,0	0	0,0	1	10,0	0	0,0	0	0,0

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹	N°	% ¹
2010	20	16	80,0	10	62,5	3	18,8	0	0,0	3	18,8	4	20,0	10	50,0
2011	20	18	90,0	16	88,9	1	5,6	0	0,0	1	5,6	2	10,0	10	50,0
2012	27	16	59,3	15	93,8	0	0,0	0	0,0	1	6,3	2	7,4	18	66,7
2013	29	1	3,4	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	23	79,3
2014	30	10	33,3	9	90,0	0	0,0	0	0,0	1	10,0	0	0,0	30	100,0

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

14.Mendoza

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	169	N/A	N/A	4	N/A	N/A
Casos evaluados ³	164	97,0	N/A	4	100,0	N/A
Éxito	150	88,8	91,5	3	75,0	75,0
Abandono	6	3,6	3,7	0	0,0	0,0
Fallecido	8	4,7	4,9	1	25,0	25,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	2	1,2	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	3	1,8	N/A	0	0,0	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.
Provincia de Mendoza, República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 - 4	11	11	100,0	9	81,8	2	18,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	14	14	100,0	13	92,9	1	7,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	9	9	100,0	6	66,7	3	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	15	14	93,3	4	28,6	10	71,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	21	20	95,2	6	30,0	13	65,0	1	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	13	10	76,9	4	40,0	5	50,0	0	0,0	1	10,0	0	0,0	2	15,4
30 - 34	12	12	100,0	6	50,0	5	41,7	0	0,0	1	8,3	0	0,0	0	0,0
35 - 44	10	10	100,0	3	30,0	5	50,0	2	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	23	23	100,0	7	30,4	15	65,2	0	0,0	1	4,3	0	0,0	0	0,0
55 - 64	16	16	100,0	5	31,3	8	50,0	1	6,3	2	12,5	0	0,0	0	0,0
65 - 74	19	19	100,0	9	47,4	7	36,8	1	5,3	2	10,5	0	0,0	0	0,0
75 y más	10	10	100,0	1	10,0	6	60,0	1	10,0	2	20,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	173	168	97,1	73	43,5	80	47,6	6	3,6	9	5,4	0	0,0	2	1,2

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	130	129	99,2	116	89,9	6	4,7	0	0,0	7	5,4	1	0,8	107	82,3
2011	126	110	87,3	97	88,2	5	4,5	0	0,0	8	7,3	2	1,6	112	88,9
2012	186	161	86,6	136	84,5	13	8,1	1	0,6	11	6,8	1	0,5	170	91,4
2013	148	138	93,2	123	89,1	1	0,7	0	0,0	14	10,1	9	6,1	136	91,9
2014	173	168	97,1	153	91,1	6	3,6	0	0,0	9	5,4	2	1,2	169	97,7

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

15. Misiones

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Misiones, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	74	N/A	N/A	162	N/A	N/A
Evaluados ³	72	97,3	N/A	161	99,4	N/A
Éxito	46	62,2	63,9	133	82,1	82,6
Abandono	12	16,2	16,7	20	12,3	12,4
Fallecido	14	18,9	19,4	8	4,9	5,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	2	2,7	N/A	1	0,6	N/A
Pendientes	0	0,0	N/A	0	0,0	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Misiones, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Misiones, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 - 4	19	19	100,0	8	42,1	6	31,6	5	26,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	12	12	100,0	6	50,0	4	33,3	2	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	4	4	100,0	2	50,0	0	0,0	2	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	19	19	100,0	9	47,4	7	36,8	3	15,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	24	23	95,8	12	52,2	4	17,4	4	17,4	3	13,0	0	0,0	1	4,2
25 - 29	37	35	94,6	22	62,9	8	22,9	4	11,4	1	2,9	0	0,0	2	5,4
30 - 34	22	22	100,0	11	50,0	6	27,3	3	13,6	2	9,1	0	0,0	0	0,0
35 - 44	22	22	100,0	12	54,5	6	27,3	3	13,6	1	4,5	0	0,0	0	0,0
45 - 54	31	31	100,0	15	48,4	9	29,0	2	6,5	5	16,1	0	0,0	0	0,0
55 - 64	27	27	100,0	17	63,0	3	11,1	2	7,4	5	18,5	0	0,0	0	0,0
65 - 74	9	9	100,0	6	66,7	1	11,1	1	11,1	1	11,1	0	0,0	0	0,0
75 y más	9	9	100,0	3	33,3	1	11,1	1	11,1	4	44,4	0	0,0	0	0,0
S/E	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	236	233	98,7	124	53,2	55	23,6	32	13,7	22	9,4	0	0,0	3	1,3

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Misiones, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	205	203	99,0	168	82,8	19	9,4	0	0,0	16	7,9	2	1,0	109	53,2
2011	181	162	89,5	123	75,9	23	14,2	0	0,0	16	9,9	3	1,7	105	58,0
2012	195	187	95,9	147	78,6	21	11,2	0	0,0	19	10,2	8	4,1	102	52,3
2013	193	185	95,9	143	77,3	21	11,4	0	0,0	21	11,4	4	2,1	87	45,1
2014	236	233	98,7	179	76,8	32	13,7	0	0,0	22	9,4	3	1,3	74	31,4

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Misiones, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

16. Neuquén

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	39	N/A	N/A	6	N/A	N/A
Evaluados ³	29	74,4	N/A	5	83,3	N/A
Éxito	21	53,8	72,4	5	83,3	100,0
Abandono	5	12,8	17,2	0	0,0	0,0
Fallecido	3	7,7	10,3	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	2	5,1	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	8	20,5	N/A	1	16,7	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.
Provincia de Neuquén, República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 - 4	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	5	5	100,0	0	0,0	4	80,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	6	6	100,0	1	16,7	5	83,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	5	3	60,0	1	33,3	1	33,3	0	0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0
35 - 44	12	8	66,7	1	12,5	4	50,0	1	12,5	2	25,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	6	4	66,7	0	0,0	1	25,0	2	50,0	1	25,0	0	0,0	1	16,7
55- 64	10	7	70,0	0	0,0	5	71,4	0	0,0	2	28,6	0	0,0	0	0,0
65 - 74	3	1	33,3	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	3	1	33,3	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	33,3
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	55	40	72,7	4	10,0	25	62,5	5	12,5	6	15,0	0	0,0	2	3,6

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2010 -2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	65	42	64,6	31	73,8	3	7,1	0	0,0	8	19,0	5	7,7	51	78,5
2011	55	37	67,3	28	75,7	2	5,4	0	0,0	7	18,9	0	0,0	51	92,7
2012	54	49	90,7	36	73,5	7	14,3	0	0,0	6	12,2	2	3,7	46	85,2
2013	41	33	80,5	22	66,7	3	9,1	0	0,0	8	24,2	1	2,4	33	80,5
2014	55	40	72,7	29	72,5	5	12,5	0	0,0	6	15,0	2	3,6	39	70,9

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

17. Río Negro

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	39	N/A	N/A	5	N/A	N/A
Evaluados ³	27	69,2	N/A	1	20,0	N/A
Éxito	25	64,1	92,6	1	20,0	100,0
Abandono	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Fallecido	2	5,1	7,4	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	2	5,1	N/A	2	40,0	N/A
Pendientes	10	25,6	N/A	2	40,0	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2014

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	1	1	100,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
20 - 24	3	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	66,7
25 - 29	6	4	66,7	2	50,0	2	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	33,3
30 - 34	4	4	100,0	1	25,0	2	50,0	0	0,0	1	25,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	10	6	60,0	4	66,7	2	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	7	4	57,1	2	50,0	2	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55 - 64	4	2	50,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	6	6	100,0	3	50,0	3	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	2	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0
S/E	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
Total	45	28	62,2	15	53,6	11	39,3	0	0,0	2	7,1	0	0,0	4	8,9

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Agosto 2015

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹	N°	% ¹
2010	71	68	95,8	59	86,8	5	7,4	0	0,0	4	5,9	3	4,2	65	91,5
2011	42	28	66,7	27	96,4	1	3,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	42	100,0
2012	60	38	63,3	37	97,4	1	2,6	0	0,0	0	0,0	1	1,7	55	91,7
2013	67	28	41,8	25	89,3	2	7,1	0	0,0	1	3,6	1	1,5	60	89,6
2014	71	68	95,8	59	86,8	5	7,4	0	0,0	4	5,9	3	4,2	65	91,5

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

18. Salta

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Salta, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	587	N/A	N/A	12	N/A	N/A
Evaluados ³	508	86,5	N/A	9	75,0	N/A
Éxito	419	71,4	82,5	9	75,0	100,0
Abandono	30	5,1	5,9	0	0,0	0,0
Fallecido	59	10,1	11,6	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	8	1,4	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	71	12,1	N/A	3	25,0	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Salta, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.
Provincia de Salta, República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	17	15	88,2	2	13,3	13	86,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	5,9
5 - 9	17	17	100,0	5	29,4	11	64,7	1	5,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	14	13	92,9	3	23,1	10	76,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	57	47	82,5	29	61,7	15	31,9	3	6,4	0	0,0	0	0,0	3	5,3
20 - 24	53	44	83,0	25	56,8	11	25,0	4	9,1	4	9,1	0	0,0	1	1,9
25 - 29	47	41	87,2	23	56,1	12	29,3	1	2,4	5	12,2	0	0,0	1	2,1
30 - 34	50	44	88,0	16	36,4	20	45,5	6	13,6	2	4,5	0	0,0	1	2,0
35 - 44	85	76	89,4	33	43,4	26	34,2	4	5,3	13	17,1	0	0,0	0	0,0
45 - 54	61	54	88,5	30	55,6	14	25,9	3	5,6	7	13,0	0	0,0	0	0,0
55 - 64	77	65	84,4	35	53,8	16	24,6	3	4,6	11	16,9	0	0,0	1	1,3
65 - 74	61	53	86,9	17	32,1	25	47,2	4	7,5	7	13,2	0	0,0	0	0,0
75 y más	60	48	80,0	23	47,9	14	29,2	1	2,1	10	20,8	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	599	517	86,3	241	46,6	187	36,2	30	5,8	59	11,4	0	0,0	8	1,3

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Salta, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹	N°	% ¹
2010	616	514	83,4	405	78,8	49	9,5	3	0,6	57	11,1	14	2,3	586	95,1
2011	655	593	90,5	466	78,6	54	9,1	1	0,2	72	12,1	20	3,1	636	97,1
2012	602	538	89,4	455	84,6	29	5,4	0	0,0	54	10,0	12	2,0	545	90,5
2013	653	585	89,6	463	79,1	42	7,2	0	0,0	80	13,7	17	2,6	611	93,6
2014	599	517	86,3	428	82,8	30	5,8	0	0,0	59	11,4	8	1,3	587	98,0

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Salta, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

19. San Juan

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de San Juan, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	57	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Evaluados ³	52	91,2	N/A	1	100,0	N/A
Éxito	39	68,4	75,0	1	100,0	100,0
Abandono	2	3,5	3,8	0	0,0	0,0
Fallecido	11	19,3	21,2	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	1	1,8	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	4	7,0	N/A	0	0,0	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de San Juan, República Argentina, 2016.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de San Juan, República Argentina, 2016.

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	2	1	50,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0
25 - 29	2	2	100,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	4	3	75,0	1	33,3	2	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	8	7	87,5	1	14,3	5	71,4	1	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	7	7	100,0	1	14,3	3	42,9	0	0,0	3	42,9	0	0,0	0	0,0
55- 64	10	10	100,0	3	30,0	5	50,0	1	10,0	1	10,0	0	0,0	0	0,0
65 - 74	9	7	77,8	1	14,3	4	57,1	0	0,0	2	28,6	0	0,0	0	0,0
75 y más	13	13	100,0	2	15,4	6	46,2	0	0,0	5	38,5	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	58	53	91,4	10	18,9	30	56,6	2	3,8	11	20,8	0	0,0	1	1,7

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de San Juan, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹	N°	% ¹
2010	73	71	97,3	56	78,9	4	5,6	0	0,0	11	15,5	2	2,7	51	69,9
2011	79	77	97,5	60	77,9	4	5,2	0	0,0	13	16,9	2	2,5	77	97,5
2012	61	59	96,7	44	74,6	4	6,8	0	0,0	11	18,6	2	3,3	58	95,1
2013	43	42	97,7	26	61,9	5	11,9	0	0,0	11	26,2	0	0,0	39	90,7
2014	58	53	91,4	40	75,5	2	3,8	0	0,0	11	20,8	1	1,7	57	98,3

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de San Juan, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

20. San Luis

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de San Luis, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	28	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Evaluados ³	24	85,7	N/A	0	-	N/A
Éxito	22	78,6	91,7	0	-	-
Abandono	0	0,0	0,0	0	-	-
Fallecido	2	7,1	8,3	0	-	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	-	-
Traslado	1	3,6	N/A	0	-	N/A
Pendientes	3	10,7	N/A	0	-	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de San Luis, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.
Provincia de San Luis, República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	5	4	80,0	1	25,0	3	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	3	2	66,7	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	2	2	100,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	8	7	87,5	3	42,9	3	42,9	0	0,0	1	14,3	0	0,0	0	0,0
55- 64	3	2	66,7	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	33,3
65 - 74	2	2	100,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	2	2	100,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	28	24	85,7	6	25,0	16	66,7	0	0,0	2	8,3	0	0,0	1	3,6

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de San Luis, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹	N°	% ¹
2010	38	36	94,7	26	72,2	5	13,9	0	0,0	5	13,9	1	2,6	37	97,4
2011	34	30	88,2	23	76,7	5	16,7	0	0,0	2	6,7	3	8,8	33	97,1
2012	39	39	100,0	37	94,9	1	2,6	0	0,0	1	2,6	0	0,0	39	100,0
2013	30	28	93,3	26	92,9	2	7,1	0	0,0	0	0,0	1	3,3	30	100,0
2014	28	24	85,7	22	91,7	0	0,0	0	0,0	2	8,3	1	3,6	28	100,0

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de San Luis, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

21. Santa Cruz

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	53	N/A	N/A	2	N/A	N/A
Evaluados ³	51	96,2	N/A	1	50,0	N/A
Éxito	36	67,9	70,6	1	50,0	100,0
Abandono	6	11,3	11,8	0	0,0	0,0
Fallecido	9	17,0	17,6	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	2	3,8	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	0	0,0	N/A	1	50,0	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2014.

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹
0 - 4	3	3	100,0	0	0,0	1	33,3	2	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	2	2	100,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20 - 24	7	7	100,0	4	57,1	2	28,6	1	14,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	4	4	100,0	2	50,0	2	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	6	6	100,0	3	50,0	3	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	10	9	90,0	2	22,2	4	44,4	2	22,2	1	11,1	0	0,0	1	10,0
45 - 54	9	8	88,9	5	62,5	2	25,0	1	12,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55- 64	7	7	100,0	2	28,6	1	14,3	0	0,0	4	57,1	0	0,0	0	0,0
65 - 74	3	2	66,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	1	33,3
75 y más	3	3	100,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0	2	66,7	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	55	52	94,5	19	36,5	18	34,6	6	11,5	9	17,3	0	0,0	2	3,6

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ¹	Nº	% ¹
2010	70	67	95,7	51	76,1	5	7,5	0	0,0	11	16,4	1	1,4	67	95,7
2011	61	60	98,4	48	80,0	7	11,7	0	0,0	5	8,3	1	1,6	60	98,4
2012	98	91	92,9	76	83,5	6	6,6	0	0,0	9	9,9	7	7,1	98	100,0
2013	84	81	96,4	63	77,8	7	8,6	0	0,0	11	13,6	3	3,6	84	100,0
2014	55	52	94,5	37	71,2	6	11,5	0	0,0	9	17,3	2	3,6	53	96,4

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto).

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

22. Santa Fe

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	520	N/A	N/A	40	N/A	N/A
Evaluados ³	453	87,1	N/A	31	77,5	N/A
Éxito	358	68,8	79,0	27	67,5	87,1
Abandono	57	11,0	12,6	3	7,5	9,7
Fallecido	38	7,3	8,4	1	2,5	3,2
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	11	2,1	N/A	2	5,0	N/A
Pendientes	56	10,8	N/A	7	17,5	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.
Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	13	12	92,3	1	8,3	11	91,7	0	0,0	1	8,3	0	0,0	0	0,0
5 - 9	14	14	100,0	0	0,0	12	85,7	1	7,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	9	8	88,9	0	0,0	6	75,0	2	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	62	46	74,2	2	4,3	34	73,9	9	19,6	1	2,2	0	0,0	4	6,5
20 - 24	73	66	90,4	1	1,5	50	75,8	12	18,2	3	4,5	0	0,0	1	1,4
25 - 29	57	49	86,0	2	4,1	39	79,6	7	14,3	1	2,0	0	0,0	1	1,8
30 - 34	51	47	92,2	2	4,3	38	80,9	4	8,5	3	6,4	0	0,0	1	2,0
35 - 44	97	83	85,6	4	4,8	58	69,9	11	13,3	10	12,0	0	0,0	1	1,0
45 - 54	90	75	83,3	4	5,3	58	77,3	5	6,7	8	10,7	0	0,0	3	3,3
55- 64	52	45	86,5	6	13,3	27	60,0	5	11,1	7	15,6	0	0,0	2	3,8
65 - 74	27	25	92,6	4	16,0	15	60,0	3	12,0	3	12,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	16	14	87,5	1	7,1	10	71,4	1	7,1	2	14,3	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	561	484	86,3	27	5,6	358	74,0	60	12,4	39	8,1	0	0,0	13	2,3

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹	N°	% ¹
2010	547	488	89,2	404	82,8	54	11,1	1	0,2	29	5,9	29	5,3	517	94,5
2011	510	470	92,2	388	82,6	58	12,3	0	0,0	24	5,1	25	4,9	494	96,9
2012	455	434	95,4	330	76,0	81	18,7	0	0,0	23	5,3	7	1,5	440	96,7
2013	561	486	86,6	386	79,4	78	16,0	0	0,0	22	4,5	12	2,1	535	95,4
2014	561	484	86,3	385	79,5	60	12,4	0	0,0	39	8,1	13	2,3	520	92,7

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

23. Santiago del Estero

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	110	N/A	N/A	0	N/A	N/A
Evaluados ³	84	76,4	N/A	0	-	N/A
Éxito	69	62,7	82,1	0	-	-
Abandono	7	6,4	8,3	0	-	-
Fallecido	7	6,4	8,3	0	-	-
Fracaso	1	0,9	1,2	0	-	-
Traslado	2	1,8	N/A	0	-	N/A
Pendientes	24	21,8	N/A	0	-	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.
Santiago del Estero, Del Estero República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	4	4	100,0	0	0,0	4	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	2	2	100,0	0	0,0	2	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	8	6	75,0	1	16,7	5	83,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	12,5
20 - 24	7	5	71,4	1	20,0	3	60,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
25 - 29	12	10	83,3	0	0,0	7	70,0	1	10,0	2	20,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	12	12	100,0	2	16,7	8	66,7	2	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
35 - 44	13	10	76,9	1	10,0	8	80,0	0	0,0	1	10,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	16	13	81,3	0	0,0	9	69,2	2	15,4	1	7,7	1	7,7	0	0,0
55 - 64	15	8	53,3	0	0,0	7	87,5	0	0,0	1	12,5	0	0,0	1	6,7
65 - 74	10	7	70,0	1	14,3	5	71,4	0	0,0	2	28,6	0	0,0	0	0,0
75 y más	9	6	66,7	0	0,0	4	66,7	1	16,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
S/E	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,0
Total	110	84	76,4	6	7,1	63	75,0	7	8,3	7	8,3	1	1,2	2	1,8

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹	N°	% ¹
2010	135	129	95,6	107	82,9	13	10,1	0	0,0	9	7,0	0	0,0	132	97,8
2011	123	120	97,6	105	87,5	7	5,8	0	0,0	8	6,7	1	0,8	117	95,1
2012	117	114	97,4	105	92,1	3	2,6	0	0,0	6	5,3	0	0,0	116	99,1
2013	111	60	54,1	45	75,0	7	11,7	0	0,0	8	13,3	3	2,7	108	97,3
2014	110	84	76,4	69	82,1	7	8,3	1	1,2	7	8,3	2	1,8	109	99,1

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

24. Tierra del Fuego

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	19	N/A	N/A	2	N/A	N/A
Evaluados ³	12	63,2	N/A	0	0,0	N/A
Éxito	11	57,9	91,7	0	0,0	-
Abandono	0	0,0	0,0	0	0,0	-
Fallecido	1	5,3	8,3	0	0,0	-
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	-
Traslado	4	21,1	N/A	2	100,0	N/A
Pendientes	3	15,8	N/A	0	0,0	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.
Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	1	0	0,0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100,0
5 - 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 - 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 - 19	2	1	50,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	50,0
20 - 24	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
25 - 29	3	1	33,3	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	4	2	50,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	1	50,0	0	0,0	2	50,0
35 - 44	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 - 54	3	2	66,7	1	50,0	1	50,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	33,3
55- 64	5	3	60,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	20,0
65 - 74	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	1	1	100,0	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	21	12	57,1	3	25,0	8	66,7	0	0,0	1	8,3	0	0,0	6	28,6

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹	N°	% ¹
2010	17	14	82,4	12	85,7	0	0,0	0	0,0	2	14,3	1	5,9	17	100,0
2011	21	14	66,7	12	85,7	2	14,3	0	0,0	2	14,3	1	4,8	19	90,5
2012	25	17	68,0	13	76,5	0	0,0	0	0,0	4	23,5	4	16,0	21	84,0
2013	19	18	94,7	16	88,9	1	5,6	0	0,0	1	5,6	0	0,0	18	94,7
2014	21	12	57,1	11	91,7	0	0,0	0	0,0	1	8,3	6	28,6	19	90,5

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni”, con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

25. Tucumán

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2014.

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total	188	N/A	N/A	5	N/A	N/A
Evaluados ³	144	76,6	N/A	4	80,0	N/A
Éxito	122	64,9	84,7	4	80,0	100,0
Abandono	12	6,4	8,3	0	0,0	0,0
Fallecido	10	5,3	6,9	0	0,0	0,0
Fracaso	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
Traslado	2	1,1	N/A	0	0,0	N/A
Pendientes	42	22,3	N/A	1	20,0	N/A


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

³ Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por modalidad de tratamiento. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

**Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis por grupos de edad. Ambos Sexos.
Provincia de Tucumán, República Argentina, 2014.**

Grupo de edad	Casos	Evaluados		Curado		Tratamiento completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹
0 - 4	7	7	100,0	0	0,0	7	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5 - 9	7	7	100,0	1	14,3	6	85,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 - 14	3	3	100,0	0	0,0	3	100,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15 - 19	17	13	76,5	4	30,8	8	61,5	1	7,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
20 - 24	21	16	76,2	5	31,3	8	50,0	1	6,3	2	12,5	0	0,0	2	9,5
25 - 29	17	15	88,2	3	20,0	10	66,7	2	13,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0
30 - 34	15	14	93,3	1	7,1	11	78,6	1	7,1	1	7,1	0	0,0	0	0,0
35 - 44	29	22	75,9	2	9,1	17	77,3	1	4,5	2	9,1	0	0,0	0	0,0
45 - 54	23	14	60,9	3	21,4	8	57,1	3	21,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0
55- 64	37	27	73,0	6	22,2	16	59,3	1	3,7	4	14,8	0	0,0	0	0,0
65 - 74	11	7	63,6	1	14,3	4	57,1	2	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
75 y más	6	3	50,0	0	0,0	2	66,7	0	0,0	1	33,3	0	0,0	0	0,0
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	193	148	76,7	26	17,6	100	67,6	12	8,1	10	6,8	0	0,0	2	1,0

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados

² Porcentaje sobre el total de casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Evolución de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2010 – 2014.

Año	Casos	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO ³	
		N°	% ¹	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ²	N°	% ¹	N°	% ¹
2010	172	117	68,0	99	84,6	10	8,5	0	0,0	8	6,8	0	0,0	160	93,0
2011	206	140	68,0	120	85,7	12	8,6	1	0,7	7	5,0	5	2,4	189	91,7
2012	177	146	82,5	126	86,3	13	8,9	0	0,0	7	4,8	0	0,0	168	94,9
2013	174	134	77,0	118	88,1	10	7,5	0	0,0	6	4,5	3	1,7	162	93,1
2014	193	148	76,7	126	85,1	12	8,1	0	0,0	10	6,8	2	1,0	188	97,4

Nota: A partir de 2009 Evaluados es la suma de Curados+ Tratamiento Terminado+Abandono+Fallecido+Fracaso y el % de traslados es sobre casos notificados.


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Tratamiento Directamente Observado (Supervisado+Mixto)

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.

Tendencia de los resultados de tratamiento de los casos de tuberculosis. Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2010 – 2014.



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre 2016.